

الاسم التجاري: إنداسين لبوس

التركيب: (إندوميثاسين 100 مجم)

- يرجى قراءة هذا الكتيب بعناية قبل البدء في استخدام الدواء.
- لأنه يعطيك معلومات هامة عن دوائك.
- إذا كنت تريد أن تعرف أكثر من ذلك ، أو لم تكن متأكدا من أي شيء ، اسأل الصيدلي أو الطبيب.
- احتفظ بهذه النشرة حتى الانتهاء من هذا الدواء.

ما الذي يحتوى عليه هذا الدواء

المادة الفعالة في هذا الدواء هي إندوميثاسين.
كل لبوسة تحتوي على 100مجم من إندوميثاسين.
السواغ : ويتيبسول هـ 15 ، بولى سوربات 80

معلومات عن الدواء

- إندوميثاسين هو واحد من مجموعة الأدوية التى تسمى مضادات الالتهابات غير الستيرويدية .
وتستخدم هذه الأدوية كمسكنات للآلام كما إنها تقلل التورم.
ويمكن استخدام لبوس انداسين فى :
- أمراض الالتهابات في المفاصل أو الأنسجة المحيطة بها مثل التهاب المفاصل الروماتويدي ، التهاب المفصلي العظمى ، مرض الورك التنكسي.
 - تشوه وتصلب العمود الفقري (الفقرار اللاصق).
 - آلام العضلات ، وآلام أسفل الظهر والآلام التى تتبع جراحة العظام أو المفاصل.
 - آلام الحيض.
 - النقرس.

قبل أن تأخذ الدواء

لا تستخدم لبوس انداسين إذا:

- حدث لك فى أي وقت مضى تفاعلات حساسية لإنداسين لبوس أو أي من المكونات في اللبوس.
- وقد تشمل الحساسية حدوث طفح جلدي ، حكة ، صعوبة فى التنفس أو تورم في الوجه والشفتين و الحلق أو اللسان.
- حدثت لك نوبات ربو ، تفاعلات حساسية فى الجلد ، تورم ، وخصوصا في الحلق ، أو طفح جلدي ، أو سيلان الأنف أثناء تناول الأسبرين أو مضادات الالتهابات غير الستيرويدية الأخرى أو أي من مثبطات إنزيم سيكلو أوكسيجيناز-2(على سبيل المثال دواء سيليكوكسيب) .
- كان لديك البواسير أو التهاب أو نزيف فى المستقيم.
- كان لديك سابقا أو لديك الآن قرحة فى المعدة أو نزيف في الجهاز الهضمي.
- كنت مصابا بمرض شديد في الكبد ، الكلى ، أو القلب.
- كنت تعاني من البوليبيات (السليالات) الأنفية.
- كنت في الأشهر الثلاثة الأخيرة من الحمل.
- كان سيتم إعطاء اللبوس لطفل تحت سن 12 سنة.

قد يصاحب الأدوية مثل الإندوميثاسين زيادة صغيرة فى خطر الإصابة بالنوبات القلبية ("احتشاء عضلة القلب") أو السكتة الدماغية.

يزيد أي خطر على الأرجح مع الجرعات العالية و العلاج لفترات طويلة.
لا تتجاوز الجرعة أو مدة العلاج الموصى بها.
يجب أن تناقش العلاج مع طبيبك أو الصيدلي ، إذا كان لديك مشاكل في القلب ، حدثت لك سابقا سكتة دماغية أو كنت تظن أنك قد تكون عرضة لخطر الإصابة بهذه الحالات (على سبيل المثال إذا كان لديك ارتفاع في ضغط دم أو مرض السكري أو ارتفاع في الكوليسترول في الدم أو كنت مدخنا).

تحقق من الطبيب أو الصيدلي قبل استعمال لبوس انداسين إذا :

- كان لديك اضطرابات بالنزيف أو مشاكل تخثر الدم.
- كنت تعاني من اضطراب نفسي ، الصرع أو الشلل الرعاش.
- كان لديك مشاكل في الكلى .
- كان لديك حاليا عدوى (عولجت أو لم تعالج) أو تأخذ لقاحات حية.
- كنت تعاني من أي حالات في الكبد أو القلب قد تسبب احتباس السوائل أو ارتفاع ضغط الدم .
- كنت تعاني من الربو.
- كنت تعاني من أي أمراض في الأمعاء مثل مرض كرون أو التهاب القولون التقرحي.
- كنت مصابا بالذئبة الحمراء أو غيرها من اضطرابات الأنسجة الضامة.
- كان من المقرر إجراء عملية جراحية لك.

استشر طبيبك أو الصيدلي إذا كنت تأخذ أي مما يلي :

- الأسبرين أو الأدوية ذات الصلة به (الساليسيلات).
- مضادات الالتهابات غير الستيرويدية الأخرى بما في ذلك ثنائي الفلونيزال.
- المضادات الحيوية الكينولون (مثل سيبروفلوكساسين).
- مضادات الاكتئاب من مجموعة مثبطات امتصاص السيروتونين الانتقائية (مثل باروكستين) .
- سلفونيل يوريا (التي تستخدم لعلاج السكري).
- الأدوية المستخدمة لعلاج ارتفاع ضغط الدم (مثل أتينولول ، كابتوبريل ، دوكسازوسين ، الهيدرالازين، اللوسارتان ، نيفيديبين ، بروبيرانولول أو كينبيريل).
- الأدوية المضادة للصفائح أو الأدوية التي توقف تخثر الدم.
- الليثيوم أو هالوبيريدول (الأدوية النفسية).
- الأدوية المضادة للفيروسات (مثل زيدوفدين أو ريتونافير).
- الجليكوسيدات القلبية (التي تستخدم لعلاج أمراض القلب مثل الديجوكسين).
- السيكلوسبورين أو تاكروليماس (أدوية جهاز المناعة).
- الكورتيكوستيرويدات (مضادات الالتهاب).
- الميثوتريكسات (التي تستخدم لعلاج بعض أمراض السرطان ، ومرض الصدفية الشديد و التهاب المفاصل الروماتويدي الوخيم).
- ديزموبريسين (مركب هرموني يستخدم لعلاج سلس البول الليلي الذى يحدث فى وقت النوم) .
- الثيازيدات ، فروسيميد وتريامتيرين (يستخدمون للتحكم في مستويات السوائل فى الجسم).
- الميفيبريستون (الذي يستخدم للإجهاض).
- باكوفين (باسط للعضلات).
- البننتوكسيفيلين (الذي يستخدم لعلاج أمراض الأوعية الدموية).
- البروبنيسيد (الذي يستخدم لعلاج مرض النقرس).
- حامض تيلودرونك (الذي يستخدم لعلاج أمراض العظام).

الحمل والرضاعة :

قد يجعل لبوس انداسين الأمر أكثر صعوبة لكى تصبحى حاملا. يجب عليك إبلاغ الطبيب إذا كنت تخططين لتصبحى حاملا ، أو إذا كان لديك مشاكل فى حدوث الحمل. إذا كنت حاملا أو أما مرضعة ، تحدثى إلى الطبيب أو الصيدلي قبل أن تأخذى هذا الدواء.

القيادة واستخدام الآلات :

قد يجعلك لبوس انداسين تشعر بالنعاس ، بالدوار أو يؤثر على الإبصار. تأكد من عدم تأثرك بالدواء قبل القيادة أو تشغيل الآلات.

الاحتياطات الأخرى التي يجب أن تأخذها فى الاعتبار:

قد يغير لبوس انداسين نتائج بعض اختبارات الدم أو البول. إذا ذهبت إلى طبيب آخر أو إلى المستشفى ، دعهم يعرفوا الأدوية الأخرى التي تتناولها.

مخاطر على القلب والأوعية الدموية

- قد تتسبب مضادات الالتهاب غير الستيرويدية فى زيادة خطر حدوث تخثر فى القلب والأوعية الدموية ، احتشاء عضلة القلب ، والسكتة الدماغية ، والتي من الممكن أن تكون قاتلة. قد يزيد هذا الخطر مع طول مدة الاستخدام. المرضى الذين يعانون من أمراض القلب والأوعية الدموية أو الذين يتعرضون لعوامل أخرى تزيد من خطر حدوث أمراض القلب والأوعية الدموية هم أكثر عرضة لهذه المخاطر.
- يمنع استخدام مضادات الالتهاب غير الستيرويدية فى علاج الألم أثناء العمليات الجراحية الخاصة بتحويل مسار الشريان التاجي.

مخاطر على الجهاز الهضمي

- قد تتسبب مضادات الالتهاب غير الستيرويدية فى زيادة خطر حدوث تأثيرات جانبية خطيرة بالجهاز الهضمي بما فى ذلك الالتهابات ، النزيف ، التقرح ، وثقب المعدة أو الأمعاء ، والتي من الممكن أن تكون قاتلة. ويمكن لهذه التأثيرات أن تحدث فى أي وقت أثناء الاستخدام وبدون سابق انذار. المرضى كبار السن هم أكثر عرضة لحدوث تأثيرات خطيرة بالجهاز الهضمي

كيفية استخدام الدواء

الطبيب هو الذى يقرر الجرعة الأفضل بالنسبة لك. اتبع دائما تعليمات الطبيب و الصيدلي بدقة. إذا كنت لا تفهم شيئا ، اسأل الطبيب أو الصيدلي.

الجرعة المعتادة:

البالغين: يعطى لبوس واحد فى المستقيم مساء ويكرر فى الصباح إذا لزم الأمر.
كبار السن: قد يصف لك الطبيب جرعة مختلفة و يرصد تحسن حالتك عن كثب.
الأطفال: لا يوصى به.

ينبغي استخدام هذا اللبوس وفقا للتعليمات وإعطائه فى الدبر، يجب ألا يتم بلعه.

إذا نسيت أن تأخذ لبوس انداسين :

إذا نسيت أن تأخذ لبوس، خذ لبوس آخر بمجرد أن تتذكر ما لم يكن وقت الجرعة التالية قد اقترب. لا تأخذ لبوستان فى نفس الوقت. خذ الجرعات المتبقية فى الوقت الصحيح.

إذا أخذت لبوس انداسين أكثر مما يجب :

لا تأخذ جرعة أكثر من التى وصفها لك الطبيب. إذا أخذت جرعة أكثر من التى وصفت لك أو ابتلعت أنت أو طفل بطريق الخطأ لبوس ، انتقل إلى أقرب مستشفى أو أخبر الطبيب على الفور. إذا أخذت

جرعة زائدة قد تظهر علامات مثل الصداع ، الشعور بالغثيان ، آلام أو نزيف بالمعدة ، نعاس ، دوخة ، طنين في الأذن أو إغماء.

بعد أن تأخذ الدواء

مثل الكثير من الأدوية ، قد يسبب أحيانا إندوميثاسين آثارا جانبية في بعض المرضى ، وخاصة في بداية العلاج. وقد يشمل ذلك حدوث تأثيرات على الجهاز العصبي مثل الصداع والدوخة. إذا حدث لك صداع لفترات طويلة ، أخبر طبيبك.

إذا حدث لك طفح جلدي ، أو أن أصبت بالصفراء (اصفرار الجلد أو العينين)، لا تأخذ لبوس انداسين وتحدث إلى الطبيب فوراً.

يمكن أن يحدث التهاب السحايا العقيم في بعض المرضى. قد يظهر ذلك في صورة مجموعة من الأعراض مثل الصداع ، الحمى ، تصلب الرقبة ، التعب ، الشعور بالمرض وزيادة حساسية العين للضوء الساطع. إذا أصبت بأي من هذه الأعراض التمس الرعاية الطبية على الفور.

قد يصاحب الأدوية مثل الإندوميثاسين زيادة صغيرة لخطر الإصابة بالنوبات القلبية ("احتشاء عضلة القلب") أو السكتة الدماغية.

إذا عانيت من أي من التالي في أي وقت خلال العلاج ، توقف عن استخدام الدواء واطلب فوراً المساعدة الطبية :

خروج دم في البراز ، خروج براز أسود اللون ، أو قيء به دم أو جزيئات سوداء تبدو مثل حبوب البن. توقف عن استخدام الدواء وإخبر الطبيب إذا حدث لك : عسر هضم أو حرقة ، آلام في البطن (الام في المعدة) أو أعراض أخرى في البطن.

الإندوميثاسين له بعض الآثار الجانبية مثل قلة عدد الصفائح الدموية و الفشل الكلوي. الآثار الجانبية الأخرى هي :

- تأثيرات على الدم -- تغيرات في أعداد وأنواع خلايا الدم. إذا حدثت لك كدمات ، التهاب في الحلق ، نزيف من الأنف أو عدوى أخبر الطبيب فقد يرغب في عمل اختبار للدم لك.
- تفاعلات الحساسية -- طفح جلدي والذي قد يصاحبه الحكة ، حكة ، احمرار ، تورم بالأخص في الحلق، صعوبة في التنفس ، الربو و وجود سوائل في الرئتين.
- التأثيرات على الجهاز العصبي -- تعب ، نعاس ، دوخة ، صداع ، مشاكل في الصوت ، إغماء ، دوار، عصبية ، غيبوبة ، تعب ، هلوسة (رؤية أشياء غير موجودة) ، صعوبة في النوم ، اكتئاب ، ارتباك ، قلق، اضطرابات نفسية ، حركات لا إرادية ، فقدان تناسق الحركات ، خدر ، وخز ، حدوث أو تفاقم نوبات مرضية ومتلازمة الشلل الرعاش.
- تأثيرات على العين -- ألم في وحول العين ، عدم وضوح أو ازدواج الرؤية ، التهاب في العصب البصري ، ترسبات على قرنية العين أو تأثيرات على شبكية العين .
- التأثيرات على الأذن-- رنين أو طنين أو اضطرابات السمع الأخرى (نادرا الصمم).
- التأثيرات على القلب -- تورم الكاحلين خاصة، وارتفاع أو انخفاض ضغط الدم ، آلام في الصدر ، خفقان القلب بسرعة أو عدم انتظام و قصور القلب.
- التأثيرات على المعدة -- الشعور بالغثيان ، آلام أو اضطراب في البطن ، فقدان الشهية ، إمساك أو إسهال ، انتفاخ البطن ، التهاب في الفم أو الأمعاء أو تدهور هذه الحالات وتقرح الأمعاء الذي يمكن أن يسبب النزيف ، الانسداد أو حدوث ثقب ، تفاقم مرض كرون أو التهاب القولون التقرحي.
- التأثيرات على الكبد -- التهاب ، يرقان (اصفرار الجلد أو العينين).
- التأثيرات على الجلد -- الحساسية للضوء ، وتفاقم الصدفية.
- التأثيرات على الكلى -- التهاب ، مرض أو قصور الكلى ، ظهور الدم أو البروتين في البول وزيادة

اليوريا في الدم.

- التأثيرات الأخرى -- زيادة نسبة السكر في الدم ، وجود السكر في البول ، ارتفاع البوتاسيوم في الدم ، النزيف من المهبل ، تغيرات في الثدي (كبر حجم و لين الثدي ، تغيرات في الثدي لدى الرجال) ، احمرار ، التعرق ، ضعف العضلات ، تدهور تلف الغضروف وقرح الفم.
- التأثيرات المرتبطة باستخدام لبوس انداسين -- النزيف ، الالتهابات ، آلام كالحرق ، عدم الراحة ، حكة أو الشعور بامتلاء المستقيم.

أخبر طبيبك إذا لاحظت أو كنت قلقا من أي من الآثار المذكورة أو لاحظت أي آثار أخرى غير مدرجة. إذا حدثت لك أي آثار أخرى غير عادية ، أخبر الطبيب أو الصيدلي فورا ، و اطلب المشورة.

تخزين الدواء

- لا تستخدم اللبوس بعد نهاية شهر انتهاء الصلاحية الذي يظهر على أغلفة المنتجات.
- احفظ اللبوس عند درجة حرارة لا تزيد عن 30 درجة مئوية.
- قم بتخزين لبوس انداسين في مكان آمن بعيدا عن متناول و بصر الأطفال.
- تذكر أن هذا الدواء لك فقط. لا تقم بإعطائه لأي شخص آخر. فقد يضرهم ، حتى لو أعراضهم هي نفس التي لديك.

العبوة:

علبة كرتون تحتوى على شرائط بيضاء (LDPE/PVC) ، كل شريط يحتوى على 5 لبوسات مع نشرة داخلية.