

## الاسم التجاري: سبازموسين أقراص

### التركيب: هيسين بيوتاييل برومايد 10 مجم

يرجى قراءة هذه النشرة بعناية قبل البدء في تناول الدواء.

- احتفظ بهذه النشرة. فقد تحتاج لقراءتها مرة أخرى.
- إذا كان لديك أي أسئلة أخرى ، إسأل طبيبك أو الصيدلي.
- هذا الدواء تم وصفه لك. لا تعطيه للآخرين. فقد يضرهم حتى لو كانت لديهم نفس الأعراض.
- إذا أصبحت أي من الآثار الجانبية خطيرة أو مزعجة ، أو إذا لاحظت أي آثار جانبية غير المدرجة في هذه النشرة ، يرجى إخبار الطبيب أو الصيدلي.

### في هذه النشرة :

1. ما هي أقراص سبازموسين و فيما تستخدم .
2. قبل أن تتناول أقراص سبازموسين
3. كيفية تناول أقراص سبازموسين
4. الآثار الجانبية المحتملة
5. كيفية تخزين أقراص سبازموسين
6. مزيد من المعلومات

### 1. ما هي أقراص سبازموسين و فيما تستخدم :

تحتوي أقراص سبازموسين على دواء يدعى هيسين بيوتاييل برومايد و هو ينتمي إلى مجموعة من الأدوية التي تسمى "مضادات التقلصات".

تستخدم أقراص سبازموسين لتخفيف التقلصات في عضلات:

- المعدة
  - الأمعاء
  - المثانة و الجهاز البولي
- كما يمكن استخدامها للتخفيف من أعراض القولون العصبي.

### 2. قبل أن تتناول أقراص سبازموسين:

لا تتناول أقراص سبازموسين إذا :

- كانت لديك حساسية من مادة الهيسين بيوتيل برومايد أو أي من المكونات الأخرى للدواء.
  - كان لديك جلوكوما (مرض في العين).
  - كان لديك تضخم في القولون.
  - كان لديك ما يسمى بمرض "الوهن العضلي الوخيم" (مرض نادر جدا يسبب ضعف العضلات).
  - كنت حاملا ، تخططين للحمل ، أو أما مرضعة.
- لا تأخذ هذا الدواء إذا كان أي من أعلاه ينطبق عليك. إذا كنت غير متأكد ، تحدث إلى طبيبك أو الصيدلي قبل تناول هذا الدواء.

اتخذ عناية خاصة عند تناول سبازموسين أقراص.

- راجع الطبيب أو الصيدلي قبل تناول الدواء في الحالات التالية :
- إذا كان معدل ضربات قلبك سريع جدا أو لديك مشاكل أخرى في القلب.
  - لديك مشكلة في الغدة الدرقية مثل فرط نشاط الغدة الدرقية.
  - لديك صعوبة أو ألم عند التبول كما هو الحال في الرجال الذين يعانون من مشاكل البروستاتا.
  - لديك إمساك.
  - لديك حمى.
- إذا لم تكن متأكدًا إذا كان أي مما سبق ينطبق عليك ، تحدث إلى الطبيب أو الصيدلي قبل تناول سبازموسين أقراص.

### تناول أدوية أخرى

- يرجى إخبار الطبيب أو الصيدلي إذا كنت تتناول أو تناولت مؤخرًا أي أدوية أخرى. وهذا يشمل الأدوية التي تم الحصول عليها من دون وصفة طبية والأدوية العشبية. وذلك لأن سبازموسين أقراص يمكن أن يؤثر على طريقة عمل بعض الأدوية الأخرى. كما يمكن أيضا أن تؤثر بعض الأدوية الأخرى على طريقة عمل سبازموسين أقراص.
- إخبار الطبيب أو الصيدلي ،على وجه الخصوص إذا كنت تتناول أي من الأدوية التالية :
- الأدوية التي تعالج الاكتئاب " مضادات الاكتئاب ثلاثية الحلقات" مثل دوكسيبين.
  - أدوية الحساسية و دوار السفر التي تدعى "مضادات الهيستامين".
  - الأدوية التي تضبط ضربات القلب مثل كينيدين أو ديسوبيراميد .
  - الأدوية التي تعالج المرض العقلي الشديد مثل هالوبيريدول أو فلوفينازين.
  - الأدوية التي تعالج مشاكل التنفس مثل تيوتروبيوم وإبراتروبيوم .
  - دواء أمانتادين : الذي يستخدم لعلاج مرض باركنسون ومرض الانفلونزا .
  - دواء ميتوكلوبراميد : الذي يستخدم لعلاج الشعور بالغثيان.

إذا لم تكن متأكدًا مما إذا كان أي من البنود أعلاه ينطبق عليك ، تحدث إلى الطبيب أو الصيدلي قبل تناول أقراص سبازموسين.

### الحمل والرضاعة الطبيعية

لا تتناولي أقراص سبازموسين إذا كنت حاملا ، تخططين لتصبحي حاملا أو أما مرضعة.

### القيادة واستخدام الآلات

قد يعاني بعض الناس من مشاكل في الإبصار عند تناول هذا الدواء. إذا حدث لك هذا ، انتظر حتى يعود البصر إلى وضعه الطبيعي قبل القيادة أو استخدام أي أدوات أو آلات.

### 3. كيفية تناول أقراص سبازموسين

تناول دائما الدواء تماما كما أخبرك طبيبك أو الصيدلي. يجب عليك التحقق مع الطبيب أو الصيدلي إذا كنت غير متأكد.

#### عند تناول الدواء

- تناول الأقراص مع الماء.
  - لا تكسر ، تسحق أو تمضغ الأقراص.
- ما هي الجرعة التي يجب تناولها من سبازموسين أقراص

### البالغين والأطفال فوق 12 سنة

- الجرعة المعتادة هي قرصين 4 مرات في اليوم .

- للتخفيف من أعراض القولون العصبي ، قد يصف لك الطبيب جرعة مبدئية قليلة هي قرص واحد 3 مرات في اليوم. ويمكن زيادة هذه الجرعة ، إذا لزم الأمر.

#### الأطفال من سن 6-12 سنة :

- الجرعة المعتادة هي قرص واحد 3 مرات في اليوم.

لا ينصح بتناول سبازموسين أقراص للأطفال أقل من 6 سنوات.

#### إذا تناولت سبازموسين أقراص أكثر مما ينبغي

إذا تناولت أقراص سبازموسين أكثر مما يجب، تحدث إلى الطبيب أو اذهب إلى المستشفى على الفور. خذ معك عبوة الدواء حتى إن لم يتبق بها سبازموسين أقراص.

#### إذا نسيت أن تتناول أقراص سبازموسين

- إذا نسيت جرعة ، تناولها بمجرد أن تتذكر. ومع ذلك ، إذا حان الوقت للجرعة التالية، تخط الجرعة الفائتة.
- لا تأخذ جرعة مضاعفة لتعويض نسيان جرعة.

#### 4. الآثار الجانبية المحتملة

مثل جميع الأدوية ، يمكن أن تسبب أقراص سبازموسين آثارا جانبية، و مع ذلك فإنها قد لا تحدث لكل الأشخاص الذين يتناولون الدواء. قد تحدث الآثار الجانبية التالية مع هذا الدواء.

#### توقف عن تناول الدواء وراجع الطبيب مباشرة إذا لاحظت أي من الآثار الجانبية الخطيرة التالية - فقد تحتاج إلى علاج طبي عاجل :

- تفاعلات حساسية مثل حدوث طفح جلدي (تؤثر على نسبة أقل من 1 في كل 100 فرد) ، وحكة .
- تفاعلات حساسية شديدة (صدمة الحساسية) مثل حدوث صعوبة في التنفس ، والشعور بالدوخة أو بالدوار (صدمة).
- احمرار و ألم في العين مع فقدان البصر.

#### الآثار الجانبية الأخرى

- جفاف الفم (يؤثر على نسبة أقل من 1 في كل 100 فرد) .
- قلة إفراز العرق عن المعتاد (تؤثر على نسبة أقل من 1 في كل 100 فرد) .
- زيادة معدل ضربات القلب (تؤثر على نسبة أقل من 1 في كل 100 فرد) .
- عدم القدرة على التبول (تؤثر على نسبة أقل من 1 في كل 1000 فرد) .
- إذا أصبحت أي من الآثار الجانبية مزعجة أو خطيرة ، أو إذا لاحظت أي آثار جانبية غير المدرجة في هذه النشرة ، أخبر طبيبك أو الصيدلي.

#### 5. كيفية تخزين أقراص سبازموسين

- لا تأخذ هذا الدواء بعد تاريخ انتهاء الصلاحية المطبوع على العبوة.
- ينبغي حفظ أقراص سبازموسين بعيدا عن الضوء وتخزينها في مكان جاف عند درجة حرارة لا تزيد عن 30 درجة مئوية .
- احفظ هذا الدواء بعيدا عن بصر و متناول الأطفال.

## 6. مزيد من المعلومات

ما الذى تحتوي عليه أقراص سبازموسين  
كل قرص يحتوي على 10 مجم من المادة الفعالة هيوسين بيوتايل برومايد.  
المكونات الأخرى هي :  
ميكروكريستالين سيليلولوز بى اتش 102، نشاء الذرة، ماجنيسيوم ستياريت.