

الأسم التجاري: نوراسين اقراص

بيان التركيب:

كل قرص يحتوى على:

نورفلوكساسين ٤٠٠ مجم

الصفات الدوائية:

نوراسين علاج مضاد للبكتيريا واسع المجال عن طريق الفم.
نورفلوكساسين فعال ضد انواع عديدة من البكتيريا الهوائية موجبة و سالبة الصبغة يحدث نورفلوكساسين التأثيرات الآتية داخل اى-كولاى:
- تثبيط التفاف ال دين.أ المعتمد على ايه-تى-بى و المحفز بواسطة د-ن- أ جيراز
- تثبيط ارتخاء التفاف د.ن.أ مع تحفيز كسر ال دين.أ
من النادر حدوث مقاومة لتأثير نوراسين فى تجارب المختبر بسبب التبدل التلقائى للبكتيريا.

حركية الدواء:

يكون الامتصاص سريعا بعد جرعة واحدة مقدارها ٤٠٠ مجم من نوراسين اقراص و يصل اعلى تركيز فى المصل و البلازما فى المتوسط الى ١,٥ ميكروجرام / مل بعد ساعة واحدة من تعاطى الجرعة

نصف العمر الفعال لنورفلوكساسين فى المصل و البلازما من ٣-٤ ساعات و يصل تركيز نورفلوكساسين لحالة الاستقرار خلال ساعتين من تعاطى الجرعة، قد يقلل الطعام من امتصاص نوراسين اقراص
يخرج نورفلوكساسين عن طريق الايض و المرارة و الكلى. و يتراوح ارتباط نورفلوكساسين مع بروتين المصل من ١٠-١٥ %

دواعى الاستعمال:

يوصف نوراسين لعلاج البالغين المصابين بالعدوى من الميكروبات فى الحالات التالية:
- عدوى المجارى البولية المعقدة و غير المعقدة.
- التهاب البروستاتا نتيجة الإصابة باى كولاى.

موانع الاستعمال:

يمنع استعمال نوراسين فى المرضى اللذين لديهم تاريخ حساسية، التهاب الاوتار او تمزقها و التى تكون مرتبطة باستعمال نورفلوكساسين او اى مركب اخر من مركبات مجموعة الكينولون المضادة للميكروبات.

الآثار الجانبية:

تفاعلات جلدية: حساسية /سمية ضوئية، طفح جلدى.
تفاعلات فى الكبد: فشل كبدي، قد يهدد الحياة.
قد يحدث التهاب فى المعدة، ترح، تنميل، طنين بالأذن، قلة الكريات البيضاء المحببة.
التأثيرات السلبية بعد التسويق: تفاقم مرض الوهن العضلي الوبيل.

التفاعلات الدوائية:

- يرفع نوراسين مستوى الثيوفيلين و السيكلوسبورين فى البلازما.
- قد يزيد نوراسين من تأثير مضادات التجلط الفمية او مشتقاتها.
- يقلل بروبينيسيد من اخراج نوراسين عن طريق البول.
- قد يعاكس نيتروفيوراننتوين من التأثير المضاد البكتيرى للنوراسين فى المجارى البولية.
- يجب عدم تعاطى الفيتامينات، او المنتجات الاخرى التى تحتوى على حديد، زنك، مضادات الحموضة او سكر الفات مع او خلال ساعتين من تناول نوراسين لانها قد تتداخل مع امتصاصه

التحذيرات والاحتياطات :

- تم رصد حالات التهاب الغشاء القولوني الكاذب مع استعمال نوراسين و الذى تتراوح شدته من طفيف الى مهدد للحياة.
- يجب على مرضى السيلان الذين يعالجوا بنوراسين اجراء اختبارات المصل للتحقق من مرض الزهري بعد ثلاثة اشهر
- تم رصد حدوث تشنجات و حساسية شديدة فى المرضى الذين يتعاطون نوراسين
- يجب وقف استخدام نوراسين عند حدوث الم،التهاب او تمزق للاوتار
- قد يسبب نوراسين دوخة و صداع خفيف و لذلك على المرضى توخى الحذر عند القيادة، استخدام الماكينات او اجراء انشطة تتطلب يقظة ذهنية
- يجب تحاشى التعرض الزائد لاشعة الشمس
- تفاقم مرض الوهن العضلي الوبيل (وهو مرض يسبب ضعف العضلات). قد تتسبب الفلوروكينولونات في تفاقم أعراض مرض الوهن العضلي الوبيل، و يشمل ذلك حدوث ضعف بالعضلات ومشاكل في التنفس. اتصل على الفور بمقدمي الرعاية الصحية إذا حدث لديك تفاقم لضعف العضلات أو مشاكل في التنفس.
- اخبر مقدمي الرعاية الصحية بحالتك الصحية، بما في ذلك إذا كان لديك مرض يسبب ضعف العضلات (مرض الوهن العضلي الوبيل).
- يجب عدم استخدام المستحضرات المحتوية على أحد المواد المنتمية لمجموعة الكينولونات للمرضى أقل من سن 18 سنة و كذلك للسيدات الحوامل و المرضعات إلا إذا كان ميزان المنافع للمستحضر يفوق المخاطر.
- تم الإبلاغ عن حدوث بعض التأثيرات الخطيرة وفى بعض الأحيان المهددة للحياة فى المرضى بسبب فرط الحساسية، و البعض الآخر ناتج عن أسباب غير مؤكدة، بصورة نادرة فى المرضى الذين يتلقون العلاج بالكينولونات بما في ذلك نورفلوكساسين. قد تكون هذه التأثيرات بصفة عامة شديدة و تحدث فى أعقاب تناول جرعات متعددة. تشمل المظاهر الإكلينيكية واحدة أو أكثر من التالى :
- 1 - الحمى ، الطفح الجلدي أو التفاعلات الجلدية الخطيرة (على سبيل المثال انحلال البشرة السمي، متلازمة ستيفنز جونسون).
- 2 - التهاب الأوعية : ألم المفاصل، ألم العضلات و داء المصل .
- 3- الالتهاب الرئوي الناتج عن الحساسية .
- 4- التهاب الكلى الخلالي، قصور أو فشل كلوي حاد.
- 5 - التهاب الكبد ، اليرقان، النخر أو الفشل الكبدى الحاد.
- 6 - فقر الدم، بما في ذلك نقص الصفائح الانحلالي واللاتسجي، نقص كرات الدم البيضاء، ندرة المحييات، نقص شامل فى خلايا الدم و / أو اضطرابات الدم الأخرى.
- ينبغي وقف تناول الدواء فوراً عند أول ظهور للطفح الجلدي، اليرقان، أو أي علامة لفرط الحساسية.
- من الممكن أن تحدث حساسية من الضوء بدرجات من متوسطة إلى شديدة.
- يزيد خطر التعرض لحدوث اضطرابات خطيرة في الأوتار عند تناول الكينولون في من هم أكثر من 65 سنة من العمر، و الذين يتناولون الكورتيكوستيرويدات.
- الاستخدام فى المرضى المسنين:
- * بشكل عام، قد يكون المرضى المسنين أكثر عرضة للتأثيرات المتبادلة للأدوية على الفاصل الزمني كيو تى سى.
- * المرضى الذين يزيد عمرهم عن 65 سنة من العمر هم في خطر متزايد لحدوث اضطرابات شديدة فى الأوتار بما في ذلك تمزق الأوتار عندما يعالجون بالمضادات الحيوية

من نوع الفلوروكينولون مثل نورفلوكساسين .

الحمل و الرضاعة:

يجب عدم استخدام المستحضرات المحتوية على أحد المواد المنتمجة لمجموعة الكينولونات للسيدات الحوامل و المرضعات إلا إذا كان ميزان المنافع للمستحضر يفوق المخاطر.

الجرعة الزائدة:

في حالة الجرعة الزائدة، يجب افراغ المعدة بالحث على القيء او غسيل المعدة، مع ملاحظة المريض جيدا و اعطائه العلاج التدعيمى و علاج الاعراض و يجب المحافظة على اعطاء السوائل.

الجرعة و التعاطي:

- يؤخذ نوراسين بعد الاكل بساعة او قبل الاكل بساعتين .
- يؤخذ نوراسين مع كوب ماء.
- يجب المحافظة على تعاطي السوائل.

في حالة وظائف الكلى الطبيعية:

العدوى	نوعها	الجرعة	تكرار العلاج	المدة
المجارى البولية.	عدوى المجارى البولية الغير معقدة (التهاب المثانة) نتيجة للاصابة باى-كولاي، كليبسيلا نيومونيا، بروتيس ميرابيليس	٤٠٠ مجم	كل ١٢ ساعة	٣ ايام
	عدوى المجارى البولية الغير معقدة نتيجة للاصابة بالميكروبات الاخرى	٤٠٠ مجم	كل ١٢ ساعة	٧-١٠ ايام
	عدوى المجارى البولية المعقدة	٤٠٠ مجم	كل ١٢ ساعة	١٠-٢١ يوم
الأمراض التى تنتقل جنسيا	مرض السيلان الغير معقد	٨٠٠ مجم	جرعة واحدة	يوم
التهاب البروستاتا	الحاد و المزمن	٤٠٠ مجم	كل ١٢ ساعة	٢٨ يوم

فى حالة التلّف الكلوى:

فى المرضى اللذين لدهم معدل تصفية الكرياتينين ٣٠ مل / دقيقة / ١,٧٣م² او اقل تكون الجرعة الموصوفة (٤٠٠ مجم) قرص واحد مرة واحدة يوميا.

الفئة العلاجية : مضاد للبكتيريا.

الفئة القانونية: يصرف بتذكرة طبية.

العبوة:

علبة كرتون تحتوى على شريط واحد (AI/P.V.C.) من 10 أقراص و نشرة داخلية.
التخزين: يحفظ فى مكان جاف، بعيدا عن الضوء عند درجة حرارة أقل من 30 °م.

تحذير لاتباع الاستعمال الجيد للدواء

(ان هذا الدواء)

- الدواء مستحضر يؤثر على صحتك و استهلاكه خلافا للتعليمات يعرضك للخطر .
- أتبع بدقة وصفة الطبيب و طريقة الاستعمال المنصوص عليها و تعليمات الصيدلى الذى صرفها لك .
- فالطبيب و الصيدلى هما الخبيران بالدواء و بنفعه و ضرره .
- لا تقطع مدة العلاج المحددة لك من تلقاء نفسك .
- لا تكرر صرف الدواء بدون وصفة طبية .

لا تترك الأدوية فى متناول أيدي الأطفال