

الأسم التجارى : ريبافيرين شراب

الأسم العلمي : ريبافيرين

بيان التركيب :
كل 100 مل تحتوى على:
ريبافيرين 4 جم
سواع

سكروز ، جلسرين ، سوربيتول سائل 10% ، بروباليلين جليكول ، صوديوم سيتريت ، حمض الستريك ، صوديوم بنزوات.

الشكل الصيدلى: شراب

الصفات الدوائية :
يعتبر ريبافيرين مادة مشابهة لنيوكليوسيد .

حركية الدواء:

يتم إمتصاص ريبافيرين بسرعة و بالكامل بعد تعاطى الجرعة الفميه و لكن نتيجة الأيض فى الكبد فإن التوازن الحيوى المطلق له يصل إلى 64% يوجد علاقه خطيه بين الجرعة و المساحه تحت المنحنى بعد تناول جرعات من 200-1200 مجم من ريبافيرين يصل التركيز الثابت لمستحضر ريبافيرين بعد حوالي 4 أسابيع من تناول الدواء بجرعة 600 مجم مرتين يوميا

دواعى الإستعمال : فى البالغين :

يستخدم ريبافيرين شراب مع حقن بيجنتريفرون الفا لعلاج التهاب الكبد الوبائى سى المزمن فى المرضى الذين تبلغ اعمارهم 18 عام أو اكثرا ولديهم امراض سابقة فى الكبد ولم يتم معالجتهم بواسطة انترفيرون الفا .

فى الأطفال :
 يستخدم ريبافيرين شراب مع حقن انترفيرون الفا لعلاج التهاب الكبد الوبائى سى المزمن فى المرضى الذين تتراوح اعمارهم بين 3 سنوات فاكثر ولديهم امراض سابقة فى الكبد ولم يتم معالجتهم بالفا انترفيرون والمرضى الذين اصابتهم انتكاسه بعد العلاج بالفا انترفيرون .

الجرعة و التعاطى: للبالغين (18 عام أو اكثرا):

- تترواح مدة العلاج للمرضى الذين لم يعالجوها من قبل بانترفيرون بين 24-48 أسبوع.
- يجب قياس مدى استجابة الفيروس بعد 24 أسبوع من العلاج مع وقف العلاج في حالة عدم الاستجابة المطلوبة.
- في المرضى الذين يحدث لهم انتكاسة بعد علاجهم بالأنترفيرون الغير مقترن ببولي ايثلين جليكول منفرداً، تكون مدة العلاج الموصوفة 24 أسبوع.

وزن الجسم	ريباافيرين شراب
$\geq 75 \text{ كجم}$	2 x 5 مل شراب صباحا 3 x 5 مل شراب مساء يوميا
$< 75 \text{ كجم}$	3 x 5 مل شراب صباحا 3 x 5 مل شراب مساء يوميا

- الجرعة الموصوفة ومدة العلاج في مرض التهاب الكبد الوبائي سى كالتالى

الطراز الجينى	جرعة بيجنترفيرون الفا-2أ الأسبوعية	جرعة ريبافيرين اليومية	مدة العلاج
الطراز الجينى 4,1	180 مكجم	$1000 \text{ مجم} > 75 \text{ كجم}$ $1200 \text{ مجم} \leq 75 \text{ كجم}$	48 أسبوع 48 أسبوع
الطراز الجينى 3,2	180 مكجم	800 مجم	24 أسبوع

للأطفال:

- الجرعة الموصوفة لريباافيرين : 15 مجم / كجم يوميا عن طريق الفم (الجرعة مقسمة صباحا ومساء)
- الجرعة الموصوفة ومدة العلاج كالتالى :

وزن الجسم	ريباافيرين شراب	حقن انترفيرون الفا 2- ب
$36-25 \text{ كجم}$	5 x 1 مل شراب صباحا 5 x 1 مل شراب مساء يوميا	3 مليون وحدة دولية / m^2 3 مرات أسبوعيا تحت الجلد
$49-37 \text{ كجم}$	5 x 1 مل شراب صباحا 5 x 2 مل شراب مساء يوميا	3 مليون وحدة دولية / m^2 3 مرات أسبوعيا تحت الجلد

الجلد		
3 مليون وحدة دولية / م ²	2 x 5 مل شراب صباحا	
3 مرات اسبوعيا تحت الجلد	2 x 5 مل شراب مساء يوميا	61 - 50 كجم

موانع الاستعمال :

- يمنع استخدام ريبافيرين شراب في المرضى الذين لديهم تاريخ حساسية لمادة ريبافيرين أو أي مكون آخر في الشراب.
- يجب عدم استخدام (Ribavirin مع حقن انترفيرون الفا) في المرضى الذين يعانون من التهاب الكبد الوبائي ذاتي المناعة ، لأنه قد يزيد من سوء حالة المرض.
- يجب عدم استخدام ريبافيرين شراب في المرضى الذين يعانون من امراض الدم في الهايموجلوبين (مثل : الثلاثيمية الكبرى ، فقر الدم المنجل).

الآثار الجانبية :

قد تظهر بعض من هذه الآثار الجانبية في بعض الحالات :

قد يحدث تعب ، صداع ، دوخة ، غثيان ، فقدان للشهيق ، إسهال ، قيء ، ألم في البطن ، نقص الكريات البيض المتعادلة ، فقر الدم، فلة الكريات البيض، قلة الصفائح الدموية ، الم في العضلات ، الم في المفاصل ، أرق ، ضيق النفس ، حكه ، طفح ، حمى ، ازدياد التعرق ، احمرار ، جفاف في الفم ، صلع ، جفاف في الجلد ، قلق ، عدم استقرار في العواطف ، كحة ، سرعة التهيج.

التفاعلات الدوائية:

- لا ينصح باستخدام ريبافيرين شراب متزامنا مع عقار ديدانوزين.
- يبطئ ريبافيرين من فسفة ستافودين و زيدوفودين مما قد يؤدي إلى تقليل التأثير المضاد للفيروس لذلك يجب توخي الحذر عند استخدام ريبافيرين مع عقار ستافودين و زيدوفودين.

الحمل:

قد يؤدي استعمال ريبافيرين إلى حدوث تشوهات و / أو وفاة للجنين لذلك:

- يجب توخي الحذر الشديد لتحاشى حدوث حمل في المرضى السيدات أو في زوجات المرضى الرجال الذين يتناولون ريبافيرين.
- يجب على المرضى الرجال وزوجاتهم استخدام وسائل فعالة لمنع الحمل (وسيلتين) أثناء العلاج بريبيافيرين و بعد انتهاء العلاج بستة أشهر.

الرضاعة:

يجب اتخاذ قرار إما بوقف الرضاعة أو وقف أو تأجيل العلاج بريبيافيرين.

التحذيرات والاحتياطات :

- لا يعتبر العلاج بريبيافيرين وحده علاجا فعالا في حالة التهاب الكبد الوبائي سى المزمن ولذلك يجب عدم استخدامه منفردا .
- يعتبر فقر الدم الانحلالي من أكثر آثار ريبافيرين الضار ، ويكون الهبوط في مستوى الهايموجلوبين ملحوظا ، ولذلك ينصح بقياس الهايموجلوبين والراسب الدموي قبل العلاج بريبيافيرين وفي الأسبوع الثاني والرابع من العلاج .
- يجب على المرضى الذين يعانون من امراض في القلب عمل رسم للقلب قبل واثناء العلاج بريبيافيرين .
- يجب وقف استخدام ريبافيرين في المرضى الذين لديهم التهاب في البنكرياس ، رشح رئوي أو تلف في وظيفة الرئة .
- يجب عدم استخدام ريبافيرين في المرضى الذين يكون لديهم تصفية الكرياتينين أقل من 50 مل في الدقيقة .

الفئة العلاجية: مضاد للفيروس

الفئة القانونية: يصرف بتذكرة طبية

التخزين: يحفظ عند درجة حرارة لا تزيد عن 30°م، بعيدا عن الضوء.

العبوة:

زجاجات تحتوى كل منها على 100 مل

تحذير لاتباع الاستعمال الجيد للدواء

(ان هذا الدواء)

- الدواء مستحضر يؤثر على صحتك و استهلاكه خلافاً للتعليمات يعرضك للخطر .

- أتبع بدقة وصفة الطبيب و طريقة الاستعمال المنصوص عليها و تعليمات الصيدلى الذى صرفها لك .

- فالطبيب و الصيدلى هما الخبران بالدواء و بنفعه و ضرره .

- لا تقطع مدة العلاج المحددة لك من ثلاثة نسخ .

- لا تكرر صرف الدواء بدون وصفة طبية .

لاتترك الأدوية في، متداول أيدي الأطفال