

الأسم التجارى: فاموتين أقراص (20 مجم، 40 مجم)

يرجى قراءة هذه النشرة بعناية قبل البدء في تناول الدواء.

- حافظ على هذه النشرة. قد تحتاج لقراءتها مرة أخرى.
- إذا كان لديك أي أسئلة أخرى ، إسأل طبيبك أو الصيدلي.
- هذا الدواء تم وصفه لك. لا تصفه لآخرين. قد يسبب لهم ضررا حتى لو كان لديهم نفس الأعراض.
- إذا اصبت الآثار الجانبية أكثر شدة ، أو إذا لاحظت أي آثار جانبية غير المدرجة في هذه النشرة ، يرجى إخبار الطبيب أو الصيدلي.

1. ما هو فاموتين و فيما يستخدم

فاموتين يحتوي على مادة الفاموتيدين (إما 20 مجم أو 40 مجم). التي تنتمي إلى مجموعة من الأدوية تسمى 'غالفات'. فاموتين يعمل عن طريق خفض كمية الحامض الذي يفرز في معدتك.

يستخدم فاموتين في :

- منع حدوث قرحة المعدة أو التي تحدث في الجزء العلوي من الأمعاء (قرحة الاثني عشر).
- الشفاء من القرحة والتخفيف من أعراضها. ويمكن أيضا أن يستخدم فاموتين في تقليل فرصه إعادة الإصابة بقرحة الاثني عشر.
- علاج مرض الإرتجاع المعدي المرئي الذي ينتج من الحامض المعدي والطعام الذي يرتفع من المعدة إلى المرئ أو لمنع عودة الأعراض.
- متلازمة 'زولينجر إيسون' حيث تنتج المعدة حمض أكثر من اللازم.

2. قبل أن تتناول فاموتين

لا تتناول فاموتين إذا :

- كان لديك حساسية من المادة الفعالة أو أي من مكونات الدواء الأخرى.
- حدث لديك مسبقاً حساسية من دواء آخر مماثل.
- كنت حاملاً.
- كنت تحططين لتصبحي حاملاً.
- كنت أما مرضعة.

الأطفال:

لا ينبغي أن يستخدم فاموتين في الأطفال.

يجب اتخاذ عناية خاصة مع فاموتين :

إذا كان لديك مشاكل في الكلى عليك مراجعة الطبيب أو الصيدلي قبل تناول الدواء.

قد يتحقق طبيبك من عدد كرات الدم ووظيفة الكبد ، إذا كنت قد تناولت جرعات عالية من فاموتين لفترة طويلة. من المهم أن لا تتوقف فجأة عن تناول فاموتين دون التحدث إلى الطبيب إذا كنت تعاني من القرحة لمدة طويلة.

تناول أدوية أخرى

يرجى إخبار الطبيب إذا كنت تتناول أو تناولت في الآونة الأخيرة أي أدوية أخرى ، بما في ذلك التي بدون وصفة طبية.

على وجه الخصوص يجب إخبار الطبيب أو الصيدلي إذا كنت تأخذ أي من الأدوية التالية :

- البروبنيسيد ، وتستخدم لعلاج الفرس أو التهاب المفاصل الناجم عن الفرس.
- الایتراكونازول أو الكيتوكونازول ، وتستخدم في علاج العدوى الفطرية.

- الأتازانافير الذى يستخدم فى علاج عدوى فيروس نقص المناعة .
- مضادات الحموضة التى تستخدم فى علاج الحرقه أو عسر الهضم.
- السوكرافيت الذى يستخدم فى علاج القرح.

القيادة واستخدام الآلات

حدثت بعض التفاعلات السلبية فى بعض المرضى مثل الدوخة والصداع اثناء العلاج بفاموتين. ينصح بعدم قيادة السيارات أو تشغيل الآلات حتى يتضح تأثير فاموتين عليك و ما إذا كنت تواجه هذه الأعراض.

3. كيفية تناول فاموتين

فى حالات تقرح المعدة والاثنى عشر تكون جرعة اقراص فاموتين هى قرص واحد 40 مجم يؤخذ ليلا. وفي التجارب السريرية ، سببت جرعة واحدة من فاموتين اعطيت ليلا تخفيف الألم المقترب بالفرحه الهضمية ، فى خلال أسبوع واحد فى المعتاد ، كما وضعت حدا للإفراز المعدى ، ولا يتأثر التوازن الحيوي تأثرا سريريا بوجود الطعام في المعدة.

قرحة الاثنى عشر :

الجرعة الإبتدائية الموصى بها هي قرص واحد فاموتين 40 مجم يعطى ليلا. ويجب أن يستمر العلاج لمدة 4 إلى 8 أسابيع. في معظم المرضى يتم الإنتمام باستعمال هذا النظام في خلال أربعة أسابيع. أما المرضى الذين لم يحدث التئام لقرحتهم تماما بعد مرور أربعة أسابيع ، يوصى بإستمرار العلاج لفترة أربعة أسابيع أخرى.

العلاج الإستمراري :

للوقاية من تكرار حدوث تقرحات الإثنى عشر يوصى بإعطاء جرعة مخفضة مقدارها قرص واحد من 20 مجم من فاموتين يؤخذ ليلا. وقد استمر اعطاء هذه الجرعة الإستمرارية بفعالية في التجارب السريرية لمدة 12 شهرا.

القرحة المعدية الحميدة :

يوصى بإعطاء جرعة مقدارها قرص واحد 40 مجم فاموتين يؤخذ ليلا. ويجب أن يستمر العلاج لمدة 4- 8 أسابيع إلا اذا تبين بالمنظار حدوث التئام قبل مرور هذه المدة.

الإرتجاع المعدى المريئي :

التخفيف العرضي : قرص واحد 20 مجم من فاموتين مرتين يوميا.

العلاج الإستمراري : قرص واحد 20 مجم من فاموتين مرتين يوميا لمدة 6 إلى 12 أسبوعا. و يشعر معظم المرضى بالتحسن بعد أسبوعين.

في حالة وجود تآكل أو وجود تقرح في المريء بمحاجبة الإرتجاع المعدى المريئي ، يوصى بجرعة من فاموتين مقدارها 40 مجم مرتين يوميا ويمكن أن تعطى لمدة 6-12 أسبوعا.

متلازمة زولينجر إيسون:

المرضى الذين لم يتلقوا علاجا مسبقا مضادا للإفراز يجب ان يبدأ علاجهم بجرعة 20 مجم فاموتين كل 6 ساعات. و يجب بعده تتعديل الجرعة وفقا للاستجابة الفردية. وقد استخدمت جرعات تصل الى 800 مجم يوميا مقسمة على جرعات لفترات وصلت إلى عام كامل دون ظهور آثار غير مواتية هامة أو تسرع المناعة. أما المرضى الذين كانوا يعالجون بمضادات أخرى لمستقبلات هـ-2 فيمكن تحولهم مباشرة إلى فاموتين بجرعة أعلى من تلك الموصى بها للحالات الجديدة. ويتوقف مقدار جرعة البداية على شدة الحالة وعلى مقدار آخر جرعة من مضادات مستقبلات هـ-2 التي كانت تستعمل من قبل.

الاستخدام في علاج كبار السن :

يكون مقدار الجرعة الموصى بها في علاج المسنين مماثلة لجرعة المرضى الأصغر سنا بالنسبة لجميع دواعي الإستعمال. ولم يشاهد أى اختلاف في نسبة حدوث أو نوع الآثار الجانبية في المسنين الذين جرى علاجهم.

الإستعمال في حالات المرضى ذوى الوظيفة الكلوية الضعيفة :

بما أن إخراج الفاموتين يتم بصفة رئيسية بواسطة الكلى ، يجب توخي الحذر في المرضى ذوى الوظيفة الكلوية الضعيفة. ويجب التفكير في تخفيف الجرعات اليومية الى 20 مجم ليلا في حالة انخفاض تصفية الكرياتينين الى 10 ملليلتر / دقيقة أو أقل. و كطريقة بديلة ، يجب إطاله الفترات التي تفصل بين الجرعات لكي تتوافق مع العمر

النصفي الإطرادي لفاموتين الذي يكون أطول في هؤلاء المرضى. كما يجب أن تؤخذ استحابة المريض السريرية في الاعتبار.

الاستخدام في علاج الأطفال:

لم يتقرر بعد مدى فعالية وأمان استعمال فاموتين في علاج الأطفال.

- إذا تناولت جرعات أكثر مما يجب من فاموتين
- يرجى الاتصال بطبيبك على الفور.

إذا نسيت أن تتناول جرعة من فاموتين

- لا تأخذ جرعة إضافية. تناول الجرعة المعتادة من فاموتين في المرة القادمة.

4. الآثار الجانبية المحتملة

آثار جانبية شائعة (تحدث لأقل من 1 في 10 أشخاص)

- صداع ، دوخة
- إمساك ، إسهال

آثار جانبية غير شائعة (تحدث لأقل من 1 في 100 شخص)

- إذا حدثت لك تفاعلات حساسية ، توقف عن تناول فاموتين واستشر الطبيب فورا.

قد تشمل الأعراض ما يلي :

- * تورم الوجه ، الشفاه ، اللسان ، أو الحلق (مع صعوبة في التنفس أو البلع)
- * طفح جلدي

• جفاف الفم ، تغيرات في التذوق

• الشعور بالمرض ، قيء

• ألم خفيف في المعدة (البطن) أو إنفاخ ، التهاب كبدى.

• طفح جلدي

• فقدان الشهية

• الشعور بالتعب

• حكة

آثار جانبية نادرة جدا (تحدث لأقل من 1 في 10.000 شخص)

• صعوبة في التنفس أو صعوبة في البلع

• الشعور بالاكتئاب ، القلق ، التهيج ، الإرتباك أو رؤية أو الاستماع إلى أشياء غير موجودة (الهلوسة) وعدم المقدرة على معرفة المكان و الزمان. هذه التأثيرات عادة ما تزول بعد وقف الدواء

• صعوبة في النوم

• تشنجات في الناس الذين يعانون من مشاكل في الكليتين

• الشعور بالوخز أو التنميم

• قلة الرغبة في ممارسة الجنس

• تفاعلات جلدية شديدة المعروفة باسم متلازمة ستيفنز جونسون / أو نخر البشرة السام.

• بطء أو عدم انتظام ضربات القلب

• الالتهاب الرئوي (وأحياناً شديد) ، آلام المفاصل ، التقلصات العضلية

• اصفرار الجلد أو بياض العين ، (اليرقان) .

• اختلال في اختبارات وظائف الكبد في الدم

• انخفاض في عدد كرات الدم (عادة ما تظهر في اختبارات الدم)

• تساقط الشعر

• عدم القدرة على الانتصاب (عجز)

آثار جانبية غير معروفة

- التثدي لدى الرجل (على الرغم من أن هذا قد لا يكون ناتجاً عن فاموتين)
إذا أصبح أي من الآثار الجانبية أكثر شدة، أو إذا لاحظت أي آثار جانبية غير المدرجة في هذه النشرة الرجاء إخبار الطبيب أو الصيدلي. وسوف يساعدك إذا لاحظت ما حدث ، و وقت حدوثه و مدة استمراره.

5. كيفية تخزين فاموتين

يرجى الحفاظ على الأقراص بعيداً عن متناول وبصر الأطفال.
قم بتخزين الأقراص في درجة حرارة لا تزيد عن 30 درجة مئوية ، في مكان جاف.
لا تستخدم فاموتين بعد انتهاء تاريخ الصلاحية.

6. ما هي مكونات أقراص فاموتين؟

المادة الفعالة:

فاموتيدين 20 ، 40 مجم
كروس كارميلاوز صوديوم، سيليكون داى أوكسيد ، ميكروكريستالين سيليلولوز ،
بولي ايثيلين جليكول ، ماغنسيوم ستياريت