

الاسم التجاري: كريستاسول أقراص

الاسم العلمي: ألوبيورينول

بيان التركيب:

يحتوي كل قرص على :

المادة الفعالة:

ألوبيورينول

300 مجم

السواغ:

لاكتوز مونوهيدرات، كروس كرميلوز صوديوم، بولي فينيل بيروليدون، ماغنيسيوم ستيرات.

الشكل الصيدلي: أقراص

اقرأ هذه النشرة كاملة بعناية قبل أن تبدأ في أخذ هذا الدواء
أحتفظ بهذه النشرة. قد تحتاج أن تقرأها مرة أخرى
إذا كان لديك أسئلة أخرى، إسأل الطبيب أو الصيدلي
هذا الدواء قد تم وصفه لك. لا توصفه لأشخاص آخرين حتى إذا كان لديهم نفس الأعراض التي تعاني منها
حيث أن ذلك قد يسبب لهم ضرر.
إذا كان هناك تفاقم في الأعراض الجانبية أو إذا لاحظت ظهور أعراض جانبية غير مدونة في هذه النشرة،
أخبر الطبيب أو الصيدلي.

في هذه النشرة:

1. ما هي أقراص كريستاسول 300 مجم و في ما يتم استخدامها
2. قبل أن تأخذ أقراص كريستاسول 300 مجم
3. كيفية أخذ أقراص كريستاسول 300 مجم
4. الآثار الجانبية المحتملة

1. ما هي أقراص كريستاسول 300 مجم و فيما يتم استخدامها

ينتمي ألوبيورينول إلى مجموعة من الأدوية تسمى مثبطات الإنزيم و هو يستخدم لمنع حدوث النقرس على المدى الطويل، ومنع تكون الحصوات الكلوية وعلاج المستويات العالية من حمض اليوريك المرتبطة بالأورام و علاجها، وبعض الأمراض المرتبطة باضطرابات إنزيمية معينة مثل متلازمة ليش نيهان. يتراكم حمض اليوريك في المفاصل والأوتار في صورة بلورات مما يتسبب في حدوث التهابات. يسبب الالتهاب تورم وألم عند اللمس في الجلد الموجود حول بعض المفاصل. قد يحدث أيضا ألم شديد عند تحرك المفصل.
يستخدم ألوبيورينول في بعض أنواع الأمراض السرطانية و ذلك لما يصاحبها من زيادة في كمية حمض اليوريك في الجسم.

قبل أن تأخذ أقراص كريستاسول 300 مجم

لا تأخذ أقراص كريستاسول 300 مجم

- إذا كان لديك حساسية لمادة ألوبيورينول أو أي من المكونات في هذه الأقراص.

لا تأخذ أقراص الوبيورينول إذا كان ينطبق عليك أي من المذكور أعلاه. إذا كنت غير متأكد، تحدث مع طبيبك أو الصيدلي قبل تناول أقراص الوبيورينول

أخذ عناية خاصة مع أقراص كريستاسول 300 مجم، استشر طبيبك إذا كنت تأخذ أقراص كريستاسول 300 مجم:

- إذا كان لديك مشاكل في الكبد أو الكلى. قد يصف لك طبيبك جرعة أقل أو يطلب منك أن تأخذ الجرعة علي فترات متباعدة. وسيراقب حالتك عن كثب أيضا.
- إذا كان لديك مشاكل في القلب أو ارتفاع في ضغط الدم
- إذا كنت تواجه نوبة حالية من النقرس
- إذا كنت تعاني من مرض وراثي نادر هو عدم تحمل الجلاكتوز، نقص إنزيم اللاب لاكتاز أو سوء امتصاص الجلوكوز- الجلاكتوز.

تم رصد حالات من الطفح الجلدي الخطير (متلازمة فرط الحساسية، متلازمة ستيفنز جونسون، انحلال البشرة السمي) مع استخدام الوبيورينول. في كثير من الأحيان، يمكن للطفح أن يشمل حدوث تقرحات في الفم والحلق والأنف والأعضاء التناسلية والتهاب الملتحمة (عيون حمراء ومنتفخة). وغالبا ما يسبق هذا الطفح الجلدي الخطير أعراض تشبه الأنفلونزا، حمى، صداع، آلام في الجسم (أعراض تشبه الأنفلونزا). قد يتطور الطفح الجلدي إلى ظهور تقرحات على نطاق واسع وتقشير الجلد. ويمكن لهذه التفاعلات الجلدية الخطيرة أن تصبح أكثر شيوعا في الصينيين الهان أو من هم من تايلاند. إذا ظهر طفح جلدي أو هذه الأعراض الجلدية، توقف عن تناول الوبيورينول واتصل بطبيبك فورا.

إذا لم تكن متأكدًا مما إذا كان أي من المذكور أعلاه ينطبق عليك، تحدث مع طبيبك أو الصيدلي قبل أخذ أقراص كريستاسول.

تناول أدوية أخرى

يرجى إبلاغ الطبيب إذا كنت تتناول أو أخذت مؤخرا أي أدوية أخرى، بما في ذلك تلك التي حصلت عليها بدون وصفة طبية.

2. قبل أن تأخذ أقراص كريستاسول 300 مجم، أخبر طبيبك إذا كنت تأخذ بالفعل أي مما يلي:

- 6- مركابتوبورين الذي يستخدم لعلاج سرطان خلايا الدم.
- أزانثوبرين: دواء مثبط للمناعة.
- فيدارابين (الأدينين الأرابينوزيد) هو عقار مضاد للفيروسات يستخدم لعلاج الهربس البسيط.
- المنتجات الأخرى المستخدمة لعلاج المستويات العالية من حمض اليوريك مثل البروبنيسيد.
- الأدوية السامة للخلايا: وخاصة في المرضى الذين لديهم مشاكل في الكلى أو الكبد.
- الأسبرين.
- الثيوفيلين، ويستخدم لمشاكل في التنفس.
- الأدوية المستخدمة لنوبات التشنج (الصرع)
- ديدانوزين، ويستخدم لعلاج عدوى فيروس نقص المناعة.
- الأدوية المستخدمة لعلاج مرض السكري.
- الأدوية المستخدمة لعلاج مشاكل القلب أو المستخدمة لعلاج ارتفاع ضغط الدم (مثل مثبطات إيه سي إى أو مدرات البول).
- الأدوية المستخدمة لعلاج مشاكل حامض المعدة (مثل هيدروكسيد الألومنيوم).

- الأدوية المستخدمة لعلاج العدوى البكتيرية (المضادات الحيوية مثل أمبيسلين وأموكسيسيلين).
- الأدوية المستخدمة لعمل سيولة في الدم (مضادات التخثر مثل داي كوماول، فينبروكومون، الوارفارين).
- سيكلوسبورين: دواء يستخدم لتنشيط الجهاز المناعي بعد زرع الأعضاء و في الاضطرابات التي لها علاقة بالمناعة.
- الأدوية التي تستخدم لخفض مستويات حمض اليوريك (مثل بروبينسيد، سالييلات).

• الحمل والرضاعة

إذا كنت تخططين للحمل، أو كنت من السيدات الحوامل، لا تأخذي أقراص كريستاسول 300 مجم واتصلي بطبيبك للمزيد من المشورة. إذا كنت تخططين لإرضاع طفلك إسأل طبيبك أو الصيدلي للحصول على المشورة.

اسأل طبيبك أو الصيدلي للحصول على المشورة قبل تناول أي أدوية

القيادة واستخدام الآلات

قد يسبب كريستاسول 300 مجم النعاس أو يؤثر على رؤيتك. إذا حدثت لك هذه الأعراض يجب تجنب قيادة السيارة أو تشغيل الآلات.

معلومات هامة عن بعض المكونات

هذه الأقراص تحتوي على اللاكتوز. إذا كان طبيبك قد قال لك أنك تعاني من عدم القدرة على تحمل بعض السكريات، فلا تأخذ هذه الأقراص إلا بعد التشاور مع الطبيب.

3. كيفية تناول أقراص كريستاسول 300 مجم:

تناول دائما أقراص كريستاسول 300 مجم تماما كما قال لك طبيبك. يجب عليك مراجعة الطبيب أو الصيدلي إذا كنت غير متأكد من كيفية تناول الدواء.

هذا الدواء يوصف للاستخدام عن طريق الفم فقط. يجب ابتلاع أقراص كريستاسول 300 مجم، دون مضغ، مع نصف كوب من الماء أثناء أو بعد وجبات الطعام.

الكبار: (أكثر من 18 سنة)

الجرعة المبدئية هي عادة ما تكون 100 مجم يوميا ، بعد الطعام، ولكن يمكن أن يتم زيادتها تدريجيا خلال فترة من 1 -3 أسابيع وفقا لمستويات حمض اليوريك في الدم والبول. تعطى الجرعات التالية اعتمادا على شدة المرض.

100 مجم إلى 200 مجم هو متوسط الجرعة اليومية لمرض النقرس الخفيف.

300 إلى 600 مجم يوميا لمرض النقرس معتدل الشدة.

700 إلى 900 مجم يوميا لمرض النقرس الشديد.

يمكن أن تؤخذ جرعة تصل إلى 300 مجم مرة واحدة، وينبغي أن تقسم الجرعات الأكبر على مدار اليوم.

المرضى الذين يعانون من أمراض الكبد:

قد تحتاج إلى أن تخفض الجرعة ، وهذا يتحدد من خلال رصد مستويات حمض اليوريك في الجسم.

الأطفال: (تحت 15 سنة)

الجرعة الموصى بها هي 10 إلى 20 مجم / كجم من وزن الجسم / يوم بحد أقصى 400 مجم يوميا.

الاستخدام في كبار السن: (أكثر من 65 سنة)
تعطى أقل جرعة ممكنة على النحو الموصى به من قبل الطبيب.

المرضى الذين يعانون من أمراض الكلى:

- قد يطلب منك أن تأخذ أقل من 100 مجم كل يوم.
- أو قد يطلب منك أن تأخذ جرعة واحدة من 100 مجم على فترات أطول من يوم واحد.

الاستخدام في المرضى الذين يخضعون للغسيل الكلوي:

تتم إزالة ألوبيورينول ومشتقاته بواسطة الغسيل الكلوي. إذا تم عمل الغسيل الكلوي بصفة متكررة، يعطى 300-400 مجم من ألوبيورينول بعد كل غسيل كلوي.

علاج ارتفاع مستويات حمض اليوريك أثناء العلاج الكيميائي:

يبدأ العلاج من يوم إلى يومين قبل أخذ العلاج الكيميائي و يجب تناول 600 إلى 800 مجم يوميا مقسمة على جرعات لمدة 2 إلى 3 أيام.
يتم تحديد الجرعة المستمرة اعتمادا على الاستجابة للعلاج.
أثناء تناول هذا الدواء قد يتم تخفيض جرعة العلاج الكيميائي فقد يزيد هذا الدواء من تأثيراته.

ملاحظة: أثناء تناولك أقراص ألوبيورينول قد يطلب منك طبيبك الخضوع لاختبارات الدم العادية للتحقق من مستويات حمض اليوريك عندك، وفي بعض الحالات مراقبة وظيفة الكبد و الكلى.

إذا أخذت كريستاسول أقراص أكثر مما يجب

إذا قمت أنت أو شخص آخر بابتلاع العديد من هذه الأقراص معا، اتصل بطبيبك أو أقرب قسم الطوارئ في المستشفى على الفور. دائما قم بأخذ علبة الدواء، وهذه النشرة و أي أقراص قد تكون متبقية معك، إذا كنت تستطيع.

إذا كنت قد نسيت أن تأخذ أقراص كريستاسول 300 مجم

إذا نسيت جرعة ، قم بأخذها في أقرب وقت تتذكرها فيه وأستمر بعدها على النحو السابق. إذا كان الوقت الذي ستأخذ فيه الجرعة المنسية هو نفسه تقريبا موعد الجرعة التالية، تخط الجرعة المنسية واستمر كالمعتاد. لا تأخذ جرعة مضاعفة لتعويض الجرعة المنسية.

إذا توقفت عن أخذ أقراص كريستاسول 300 مجم

استمر في تناول الدواء كما وصفه لك الطبيب، حتى لو شعرت بتحسن. إذا كان لديك أي أسئلة أخرى عن استخدام هذا المنتج، اسأل طبيبك أو الصيدلي.

4. الآثار الجانبية المحتملة:

مثل جميع الأدوية، يمكن أن تتسبب أقراص كريستاسول 300 مجم في حدوث آثار جانبية، وإن لم تحدث للجميع.

قد تحدث تفاعلات حساسية (فرط حساسية) مع أعراض مثل الطفح الجلدي، وقشور الجلد والحمى و الدمامل و التهاب الشفتين أو الفم و التهاب الكبد في الحالات القصوى.

قد تظهر علامات نادرة جدا تشمل الأزيز المفاجئ، رفرقة أو ضيق في الصدر والانهيار، في هذه الحالة، توقف عن تناول أقراص كريستاسول 300 مجم فوراً واتصل بطبيبك أو قسم الطوارئ بالمستشفى على الفور.

إذا كنت تواجه أي من التالي، توقف عن تناول الأقراص الخاصة بك وأخبر طبيبك في أقرب وقت ممكن:

- آلام المفاصل أو تورم مؤلم في الفخذ، الإبطين، أو العنق.
- اصفرار الجلد والعينين (اليرقان).
- مشاكل في الكلى أو الكبد.
- الشعور بالغثيان أو القيء، مصحوبا في بعض الأحيان بوجود دم.
- حدوث كدمات بسهولة أكثر من المعتاد أو حدوث التهاب في الحلق أو غيرها من علامات العدوى.
- ارتفاع في درجة الحرارة.
- وجود دم في البول.
- حدوث مستويات عالية من الكولسترول في الدم.
- شعور عام بالمرض.
- ضعف أو تنميل و الشعور بعدم الثبات في القدمين، أو الإحساس بعدم القدرة على تحريك العضلات (شلل بالعضلات) أو فقدان الوعي.
- صداع، دوخة، نعاس أو اضطرابات في الرؤية.
- ألم في الصدر، ارتفاع في ضغط الدم أو بطء النبض.
- العقم الذكري أو عدم القدرة على الانتصاب.
- تضخم الثدي لدى الرجال، وكذلك النساء.
- تغيير في حركة الأمعاء الطبيعية.
- تغيير في حاسة التذوق.
- إعتام عدسة العين.
- فقدان الشعر أو تغير لونه.
- النوبات (التشنجات).
- الاكتئاب.
- تراكم السوائل مما يؤدي إلى التورم وخاصة في الكاحلين.
- الشعور بالعطش، والتعب و فقدان الوزن؛ و قد تكون هذه أعراض مرض السكري. قد يرغب طبيبك بقياس مستوى السكر في الدم لمعرفة ما إذا كان هذا قد حدث لك.
- نزيف في الشفتين والعينين والفم والأنف أو الأعضاء التناسلية
- حمى وقشعريرة، صداع، آلام العضلات (بأعراض تشبه أعراض الانفلونزا) والشعور عموما ما يرام
- أي تغييرات على بشرتك، على سبيل المثال قرح في الفم والحلق والأنف والأعضاء التناسلية و(عيون حمراء ومنتهخة) التهاب الملتحمة، وظهور بثور على نطاق واسع أو تقشير
- تفاعلات فرط الحساسية الخطيرة التي تضلع فيها الحمى والطفح الجلدي، وآلام المفاصل، وتشوهات في الدم واختبارات وظائف الكبد (وهذه قد تكون دلائل على وجود اضطراب حساسية الجهاز متعدد).
- نادر جدا (أقل من 1 يؤثر في 10,000 نسمة)
- كدمات بسهولة أكثر من المعتاد أو قد وضع التهاب الحلق أو غيرها من علامات العدوى. اتصل بطبيبك في أقرب وقت ممكن. أحيانا أقراص الوبورينول قد تؤثر على الدم أو نظام الليمفاوية. هذه الآثار عادة ما تحدث في الناس مع مشاكل في الكبد أو الكلى

إذا أصبحت أي من الآثار الجانبية خطيرة. أو إذا لاحظت أي آثار جانبية غير المدرجة في هذه النشرة، يرجى إخبار الطبيب أو الصيدلي..

الفئة العلاجية: مضاد لإرتفاع حمض اليوريك في الدم، مضاد للنقرس.

الفئة القانونية: يصرف بتذكرة طبية.

العبوة: علبة كرتون تحتوي على شريط (Al/ amber PVC) يحتوى على 10 أقراص + نشرة داخلية

التخزين: يحفظ في مكان جاف عند درجة حرارة لا تزيد عن 30°م

تحذير لاتباع الاستعمال الجيد للدواء

(ان هذا الدواء)

- الدواء مستحضر يؤثر على صحتك و استهلاكه خلافا للتعليمات يعرضك للخطر .
- أتبع بدقة وصفة الطبيب و طريقة الاستعمال المنصوص عليها و تعليمات الصيدلى الذى صرفها لك .
- فالطبيب و الصيدلى هما الخبيران بالدواء و بنفعه و ضرره .
- لا تقطع مدة العلاج المحددة لك من تلقاء نفسك .
- لا تكرر صرف الدواء بدون وصفة طبية .
- لا تترك الأدوية فى متناول أيدى الأطفال

ممفيس للأدوية و الصناعات الكيماوية .

القاهرة- مصر- ج.م.ع.