

**الاسم التجاري:** أموكلوكس "كبسول"

**بيان التركيب:**

تحتوى كل كبسولة على :

أموكسيسيلين تراى هيدرات 5, 287مجم ( مكافىء لمقدار 250 مجم أموكسيسيلين لا مائي)

داى كلوكساسيلين صوديوم مونوهيدرات 5, 272مجم ( مكافىء لمقدار 250مجم داى كلوكساسيلين )

**الصفات الدوائية:**

أموكلوكس كبسول يحتوى على أموكسيسيلين تراى هيدرات وهو مضادحيوى مشابه لأمبيسيلين وله فاعليه واسعة المجال ضد البكتريا وتشمل البكتريا موجبة وسالبة الجرام . آلية تأثير أموكلوكس تعتمد على تثبيط تشييد جدار خلية الميكروب خلال فترة التكاثر.

تحتوى كبسولات أموكلوكس كذلك على داى كلوكساسيلين صوديوم مونوهيدرات وهو مقاوم للتحطيم الذى يحدثه انزيم بنسيليناز الذى تنتجه البكتيريا وهو فعال ضد البكتريا التى تنتج والتى لا تنتج انزيم بنسيليناز والتى تشمل المكورات العنقودية ومكورات النيمونيا ومعظم سلالات المكورات السبحية المحللة للدم من نوع بيتا.

**حركية الدواء:**

أموكلوكس كبسولات تتمتع بالثبات فى وجود حامض المعده وتمتص بسرعه بعد اعطائها عن طريق الفم . يرتبط داى كلوكساسيلين مع بروتين البلازما بنسبة 97% بينما يرتبط أموكسيسيلين بنسبة 20% فقط . الأموكسيسيلين وداى كلوكساسيلين لهما نفس نصف العمر تقريبا ( ساعه واحده ) – يفرز معظم جرعة أموكلوكس فى البول دون تغيير.

**دواعى الاستعمال:**

توصف كبسولات أموكلوكس فى الحالات الآتية:

- عدوى الأنف والأذن والحنجرة الناتجة عن ميكروبات أجناس المكورات السبحية ،

( سلالات ألفا و بيتا المحللة للدم فقط ) ،المكورات السبحية الرئويه، أجناس المكورات العنقودية أو هيروفيليس انفلونزا .

- عدوى القناة البولية التناسلية الناتجة عن ميكروبات " إى كولاى ، ب – ميرابيليس و إى فيكليس".

- عدوى الجلد وخلاياه الناتجة عن الاصابه بميكروبات الأجناس السبقيه ( سلالات الفا وبيتا المحلله للدم فقط) والمكورات العنقوديه أو " إي كولاى "
- عدوى القناة التنفسيه السفليه الناتجه عن الاصابه بميكروبات الاجناس السبقيه (سلالات الفا وبيتا المحلله للدم فقط ) المكورات السبقيه الرئويه ، اجناس المكورات العنقوديه و هييموفيليس انفلونزا .
- السيلان ، العدوى الحادة غير المعقدة التى تصيب القناة التناسليه والمستقيم والمثانه الناتجه عن الاصابه بميكروب السيلان ( فى الذكور والاناث ) .
- عدوى القناة المرارويه .
- عدوى الحروق والجروح .
- علاج مرض ليم فى مراحل المبكرة .
- الحمى التيفوديه .

### موانع الاستعمال:

يمنع الاستعمال فى حالة التاريخ السابق للحساسية للبنسيلينات .

### الاحتياطات:

يجب الأخذ فى الاعتبار احتمال حدوث عدوى بالفطريات أو البكتريا المرضيه خلال فترة العلاج واذا حدث ذلك يجب وقف العلاج .

### الحمل:

لم يثبت حتى الان أمان استعمال كبسولات اموكلوكس خلال الحمل .

### الرضاعة:

تفرز البنسيلينات فى لبن الام لذلك فإن استعمال اموكلوكس كبسول خلال فترة الرضاعة قد يؤدى الى حدوث حساسيه للطفل ويجب أخذ الاحتياط عند الاستعمال .

### التداخلات الدوائيه:

- يقلل البروبنسيد افراز أموكلوكس بواسطة الكلى وهذا يزيد ويطيل مفعول اموكلوكس .

- قد تتداخل المضادات الحيويه مثل كلورامفينيكول ' ماکروليدات ، سلفوناميدات وتتراسيكلينات مع تأثير اموكلوكس المضاد للبكتيريا .

### التحذيرات:

- تم تسجيل حالات حساسيه خطيرة ( صدمة عوارية ) فى الاشخاص الذين يعالجون بالبنسيلينات .

- قبل استعمال اموكلوكس يجب التحرى الدقيق عن حدوث حساسيه سابقه للمريض نتيجة استعمال البنسيلينات ، سيفالوسبورينات والأدويه الأخرى التى تسبب الحساسيه . اذا ثبت وجود حساسيه سابقه فيجب عدم استعمال اموكلوكس واستعمال دواء آخر مناسب .

-حدوث التهاب القولون الغشائي الكاذب يجب اعتباره كتشخيص فى المرضى الذين يصابون بالاسهال بعد تعاطى اموكلوكس ( هذا يرجع الى محتواه من اموكسيسيلين).

### الآثار الجانبية:

- القناة الهضمية : غثيان – قىء – اسهال – نزيف - التهاب غشائى قولونى كاذب .
- الحساسيه : حكه ، ارتكاريا – طفح جلدى .

### زيادة الجرعة:

يوقف الدواء فى حالة زيادة الجرعه وتعالج الحالة تبعا للأعراض التى تظهر مع اتخاذ الإجراءات التدعيميه المطلوبه . اذا كان التسمم بالجرعه العاليه لازال حديثا جدا وليس هناك موانع للاستعمال فيمكن محاولة اخراج الدواء من المعده عن طريق القىء أو من خلال طرق أخرى .

### الجرعة والتعاطى:

البالغين: كبسوله واحدة كل 8 ساعات

### الفئه العلاجية: مضاد للبكتريا .

### الفئه القانونيه: يصرف بتذكرة طبيب .

التخزين: يحفظ فى مكان جاف عند درجة حرارة أقل من 30° م .  
العبوة: علبه تحتوى على 16 كبسوله .

### هذا الدواء:

- الدواء منتج يؤثر على صحتك واستعماله بما يخالف التعليمات يمثل خطورة عليك .
- اتبع بدقه وصفة الطبيب ، وطريقة الإستعمال ، وتعليمات الصيدلى الذى قام ببيع الدواء .
- الطبيب والصيدلى لديهما خبرة فى الدواء وفوائده ومخاطره .
- لا توقف بنفسك استعمال العلاج الموصوف لك .
- لا تكرر نفس الروشته بدون استشارة الطبيب