

الأسم التجارى: متروزول معلق

بيان التركيب :

كل 5 مل تحتوى على :

بنزويل مترونيدازول

(مكافىء لـ 125 مجم مترونيدازول)

الصفات الدوائية :

يعتبر متروزول عقار مضاد للطفيليات والبكتيريا وله تأثير مضاد للميكروبات فى البيئة اللاهوائية عن طريق بعض الآليات المحتملة التالية :-

بمجرد دخول مترونيدازول الكائن الحى يختزل العقار عن طريق البروتينات الناقلة للإلكترونات داخل الخلية. وبسبب هذا التغير الذى يطرأ على جزء مترونيدازول فإنه يتم الحفاظ على تركيز مختلف داخل وخارج الخلية والذى يسمح بانتقال الدواء داخل الخلية. وبناءً على ذلك تكون الشوارد الحرجة والتى بالتالى تتفاعل مع مكونات الخلية مما يؤدى إلى موت هذه الكائنات الدقيقة.

حركية الدواء :

تعتبر مادة مترونيدازول بشكل جيد عند تناولها عن طريق الفم ، وتصل أعلى تركيزاتها فى البلازما بعد ساعة إلى ساعتين . تتناسب تركيزات مترونيدازول فى البلازما مع الجرعة التى يتم تعاطيها ، فإن تناول جرعتين بتركيز 250 مجم أو 500 مجم ينتج عنه تركيزات 6 مكجم و 12 مكجم / مل على التوالى . يصل نصف عمر الإخراج لمترونيدازول إلى 8 ساعات .

تعد الطريقة الرئيسية لإخراج متروزول ونواتج أيضه هي من خلال البول (60-80% من الجرعة) وحوالى 6-15% من الجرعة يتم إخراجها عن طريق البراز .

دواعى الاستعمال :

يستخدم متروزول فى علاج :-

-ترايكومونيازيس ذات الأعراض الظاهرة فى الذكور والإثاث .

-ترايكومونيازيس بدون عراض فى الإناث عندما يكون مصاحباً لإلتهاب بطانة وعنق الرحم أو تآكل عنق الرحم .

-فى حالات الأمبيا : الدوسنتاريا الأمبية المعوية الحادة وخراريج الكبد الأمبية .

-العدوى بالميكروبات اللاهوائية التى تنت عن الباكتيرويدات مثل إلتهاب الغشاء البريتونى ، خراريج داخل البطن ، عدوى الجلد تركيباته ، أمراض النساء والولادة (وتشمل إلتهاب بطانة الرحم ، خراريج المبيض والأتابيب ، عدوى ثنية المهبل بعد العمليات الجراحية) ، إنتان الدم البكتيرى ، عدوى العظام والمفاصل ، عدوى الجهاز العصبى المركزى ويشمل إلتهاب السحاى وخراريج المخ ، عدوى أسفل القناة التنفسية وإلتهاب بطانة القلب .

موانع الاستعمال :-

لا يوصى بتناول متروزول فى المرضى الذين لديهم تاريخ حساسية سابق لمادة مترونيدازول أو مشتقات نيترواميدازول.

التحذيرات والإحتياطات :-

يجب أخذ الحىطة عند تناول مرضى الجهاز العصبى المركزى لعقار متروزول.

تم أيضًا مستحضر متروزول ببطء في حالات مرض الكبد الشديد وبالتالي، يجب إعطاء هؤلاء المرضى جرعات أقل من الجرعات المعتادة.

- قد تصبح أعراض الإصابة المعروفة والتي لم يسبق معرفتها لحالات الكانديدا أكثر وضوحاً عند استخدام مستحضر متروزول.

الحمل :-

يمنع إستعمال متروزول خلال الثلاثة أشهر الأولى من الحمل.

الرضاعة :-

يجب اتخاذ قرار بوقف الرضاعة أو وقف استخدام الدواء مع الأخذ في الاعتبار أهمية الدواء للألم.

التدخلات الدوائية :-

يزيد متروزول من تأثير وارفارين ومضادات التجلط من نوع كيومارين مما يسبب زيادة زمن البروثرومبين.

- قد يزيد كل من فينيتيون وفينوباربิตال من إخراج متروزول مما يؤدي إلى انخفاض تركيزه في البلازما.

- في المرضى الذين يتناولون جرعات عالية نسبياً من الليثيوم، وجد أن العلاج لفترة قصيرة بمستحضر متروزول يصاحبه ارتفاع في تركيز الليثيوم في المصل وفي قليل من الحالات قد تظهر علامات للتسمم بالليثيوم.

- يجب عدم تعاطي المشروبات الكحولية أثناء فترة العلاج بمتروزول على الأقل ليوم واحد بعد العلاج وذلك لاحتمال حدوث تقلصات بالبطن، غثيان،قيء، صداع وإحمرار الوجه.

- يجب ألا يعطى متروزول للمرضى الذين يتناولون داي سلفيرام لمدة أسبوعين سابقين من تعاطي الدواء.

الأثار الجانبية :-

تم رصد الأثار الجانبية التالية أثناء العلاج بمستحضر متروزول :

غثيان ، صداع ، فقد الشهية ، أرتيكاريا ، مذاق معدنى ، نقص كرات الدم البيضاء المنعكسة ، تكاثر للكانديدا في المهبل ، جفاف الفم ، نوبات تشنجية وإعتلال في الأعصاب الطرفية .

زيادة الجرعة :-

تم رصد حالات تف بالأعصاب تشمل نوبات تشنجية ، واعتلال الأعصاب الطرفية بعد 5 إلى 7 أيام من جرعات تتراوح من 6 إلى 10.4 جم أخذت في جرعات يوم بعد يوم.
العلاج : لا يوجد ترافق محدد لعلاج زيادة الجرعة ، لذا يجب أن يكون العلاج للمربيض تدعيمى ومناسباً للأعراض.

الجرعة والتعاطي :-

حالات الأميبا :

البالغين :

حالات الأميبا المغوية الحادة (الدوستاريا الأميبية) :

750 جم (2 ملعقة كبيرة) ثلاثة مرات يومياً لمدة 5 إلى 10 أيام .

حالات خراريج الكبد الأميبية :

500 جم (2 ملعقة متوسطة) أو 750 جم (2 ملعقة كبيرة) ثلاثة مرات يومياً لمدة 5 إلى 10 أيام .

الأطفال :

35 إلى 50 جم / كجم / 24 ساعة ، مقسمة إلى ثلاثة جرعات لمدة 10 أيام .

حالات الجيارديا :

البالغين :

2 جم (8 ملائق متوسطة) يومياً لمدة 3 أيام أو 250 جم (ملعقة واحدة متوسطة)

مرتين أو ثلاثة مرات يومياً لمدة 10-5 أيام ،

الأطفال :

35-25 جم / كجم يومياً في جرعتين مقسمتين .

ترايكومونيازيس :

- علاج لمدة يوم واحد : 2 جم (8 ملائق متوسطة) تعطى إما على جرعة واحدة أو

على جرعتين مقسمتين كل واحدة منها تساوى جرام واحد (4 ملائق متوسطة)

ويتم إعطاؤهما في نفس اليوم .

- علاج لمدة 7 أيام : 250 جم (ملعقة واحدة متوسطة) ثلاثة مرات يومياً لمدة سبعة

أيام متالية .

تعطى طريقة العلاج لمدة 7 أيام نتائج أفضل من علاج اليوم الواحد .

عدوى المهبل البكتيرية :

500 جم (2 ملعقة متوسطة) مررتين يومياً لمدة 7 أيام .

التهاب القولون الناتج عن ميكروب كلوستريديم ديفيسيل :

250 جم (ملعقة واحدة متوسطة) أربع مرات يومياً لمدة 10-5 أيام .

عدوى الأسنان :

200 جم (ملعقة واحدة متوسطة) ثلاثة مرات يومياً لمدة 3-7 أيام .

الفئة العلاجية :
مضاد للطفيليات .

الفئة القانونية :
يصرف بتذكرة طبية .

التخزين :
يحفظ بعيداً عن الضوء عند درجة حرارة أقل من 30° م .

العبوة :
زجاجة 120 مللى

تحذير لاتباع الاستعمال الجيد للدواء

(ان هذا الدواء)

- الدواء مستحضر يؤثر على صحتك و استهلاكه خلافاً للتعليمات يعرضك للخطر .
- أتبع بدقة وصفة الطبيب و طريقة الاستعمال المنصوص عليها و تعليمات الصيدلي الذي صرفها لك .
- فالطبيب و الصيدلي هما الخبيران بالدواء و بنفعه و ضرره .
- لا تقطع مدة العلاج المحددة لك من تلقاء نفسك .
- لا تكرر صرف الدواء بدون وصفة طبية .

لا تترك الأدوية في متناول أيدي الأطفال