

الاسم التجاري: نيو ميدانين- أف- آر "أقراص"

بيان التركيب :

كل قرص يحتوى على :
ميثوكسالين (أمويدين)

10 مجم

الصفات الدوائية :

يزيد مستحضر نيو-ميدانين الحساسيه للضوء وبذلك فإن اعطاء الدواء ثم التعرض للأشعة فوق البنفسجية يؤدى الى الضرر بالخليه وعندما يعطى نيو-ميدانين عن طريق الفم فإنه يصل الى الجلد عن طريق الدم وتنفذ الأشعة فوق البنفسجية بدرجة كبيرة الى الجلد أيضا . والضرر الذى يلحق بالخلايا يتسبب فى حدوث تفاعل التهابى يتبعه اصلاح يظهر على شكل زيادة فى الميلانين فى البشرة وزيادة فى سمك الطبقة القرنيه. فى علاج مرض الصدف يرتبط نيو-ميدانين بالحمض النووى د.ن.أ. مسببا نقص فى تكاثر الخلايا من خلال التحطيم الضوئى للحمض النووى د.ن.أ.

دواعى الاستعمال :

يوصف مستحضر نيو-ميدانين مع الأشعة فوق البنفسجية فى علاج الأعراض الشديدة والمسببه للعجز فى مرض الصدف وكذلك علاج مرض البهق (البرص) والأعراض الجلديه فى مرض ليفوما خلايا – ت فى الأشخاص الذين لم يستجيبوا للأنواع الأخرى من العلاج .

موانع الاستعمال :

لا يستعمل نيو-ميدانين فى الحالات الآتية :

- الأشخاص الذين عندهم حساسيه لميثوكسالين أو مركبات سورالين .
- المرضى الذين عندهم تاريخ حساسيه لحالات مرضيه مثل ذأب حمامى و المهق.
- المرضى الذين يتعرضون للميلانوما ، سرطان الخلايا الحرشفية أوأبناكيا .

التحذيرات:

- قد تحدث حروق جلديه من الأشعة فوق البنفسجية أو ضوء الشمس أو الشيخوخه المبكرة للجلد اذا كانت الجرعه الموصوفه من الدواء أو برنامج التعرض لم يتم الحفاظ عليهما .
- يجب علاج المرضى ذوى القصور الكبدى بحذر حيث الأيض الكبدى للعقار مهم لطرحه فى البول.

التفاعلات الدوائية:

- يجب اعطاء عنايه خاصه للمرضى الذين يأخذون أدويه متزامنه معروف عنها أنها تزيد الحساسيه للضوء مثل جريزوفولفين وقطران الفحم وفينوثيرازين والسلفوناميدات .

الاحتياطات :

- يجب ألا يأخذ المرضى حمام شمس خلال الأربعة والعشرين ساعه السابقه على تعاطى نيو-ميدانين والتعرض للأشعة فوق البنفسجية .

- يجب أن يلبس لباس ماص للأشعة فوق البنفسجية حول النظارات الشمسية خلال فترة النهار لمدة 24 ساعة من تناول نيو-ميدانين.

- يجب حماية جلد البطن والثدى والأماكن الحساسة الأخرى من الضوء .

الحمل :

يستعمل مستحضر نيو-ميدانين فى الحوامل فى الحالات الضرورية .

الرضاعه :

يجب توخى الحذر عند استعمال نيو-ميدانين للامهات المرضعات.

الاثار الجانبيه :

اكثر الآثار الجانبيه شيوعا تشمل الغثيان ، الحكه والاحمرار المؤقت أو الخفيف.

الجرعة الزائدة :

تحفيز المريض على القيء و جلوسه فى حجرة مظلمة لمدة أربع و عشرين ساعة على الأقل .

الجرعة و التعاطى :

يتم تناول أقراص نيو- ميدانين سريع التحرر حسب وصف الطبيب.

الفئة العلاجية :

دواء لعلاج مرض جلدى.

الفئة القانونية :

يصرف بتذكرة طبية.

التخزين:

يحفظ بعيدا عن الضوء فى مكان جاف عند درجة حرارة أقل من 30°م.

العبوة:

علبة تحتوى على 50 قرص.

علبة تحتوى على 1000 قرص.

تحذير لاتباع الاستعمال الجيد للدواء

(ان هذا الدواء)

- الدواء مستحضر يؤثر على صحتك و استهلاكه خلافا للتعليمات يعرضك للخطر .
- أتبع بدقة وصفة الطبيب و طريقة الاستعمال المنصوص عليها و تعليمات الصيدلى الذى صرفها لك .
- فالطبيب و الصيدلى هما الخبيران بالدواء و نفعه و ضرره .
- لا تقطع مدة العلاج المحددة لك من تلقاء نفسك .
- لا تكرر صرف الدواء بدون وصفة طبية .

لا تترك الأدوية فى متناول أيدي الأطفال