

الاسم التجاري: ديابيل اقراص

بيان التركيب:

يحتوى كل قرص على:

جليكلازيد 80 مجم

الصفات الدوائية:

يعتبر ديابيل (جليكلازيد) نوع من السلفونيل يوريا قصير المدى وهو يساعد على إفراز الانسولين. يكون ديابيل فعال فقط فى حالة بقاء بعض نشاط لخلايا- بيتا فى البنكرياس.

دواعى الاستعمال:

يستعمل ديابيل فى علاج مرض السكر (النوع الثانى).

موانع الاستعمال:

لا يستعمل ديابيل فى:

- حالة التلف الكبدى والكلوى الشديد وفى البورفيريا.
- وجود حماض كيتونى.

الآثار الجانبية:

عادة تكون الآثار الجانبية طفيفة وغير متكررة وتشمل:
غثيان، قىء، اسهال، امساك، اضطراب فى وظيفة الكبد وتفاعلات حساسية.

التفاعلات الدوائية:

- يزيد تأثير ديابيل الخافض للسكر بمثبطات انزيم الانجيوتنسين، الستيرويدات البنية، الادوية المضادة للالتهاب الغير استيرويدية، كومارين، مثبطات انزيم المونوامين اوكسيداز، ميكونازول، سلفينبيرازون و تيستوستيرون.
- يعاكس تأثير ديابيل الخافض للسكر الفينوثيرازين، كورتيكوستيرويدات، ديازوكسيد، مدرات البول والثيازيدات، استروجين و بروجستوجين.

التحذيرات والاحتياطات:

- قد يؤدي ديابيل إلى زيادة الوزن و يجب وصفه فقط إذا استمرت الأعراض على الرغم من الحفاظ على النظام الغذائي.
- يجب توخي الحذر في كبار السن، وفي المرضى الذين لديهم تلف كبدى وكلوى طفيف أو متوسط بسبب خطر انخفاض مستوى السكر فى الدم.

الحمل:

يجب وقف العلاج بديابيل على الأقل لمدة يومين قبل الولادة.

الرضاعة:

يجب عدم تناول ديابيل اثناء الرضاعة.

الجرعة والتعاطى:

الجرعة الأولية: 40 – 80 مجم يوميا ويتم ضبطها بناء على استجابة المريض وقد تصل إلى 160 مجم كجرعة واحدة مع الافطار.
الجرعات الكبيرة تقسم، بحد اقصى 320 مجم يوميا.

الفئة العلاجية: مضاد لمرض السكر.

الفئة القانونية: يصرف بتذكرة طبية.

العبوة:

علبة تحتوى على 20 قرص.

التخزين:

يحفظ فى مكان جاف، عند درجة حرارة أقل من 30 °م.

تحذير لاتباع الاستعمال الجيد للدواء

(ان هذا الدواء)

- الدواء مستحضر يؤثر على صحتك و استهلاكه خلافا للتعليمات يعرضك للخطر .
- أتبع بدقة وصفة الطبيب و طريقة الاستعمال المنصوص عليها و تعليمات الصيدلى الذى صرفها لك .
- فالطبيب و الصيدلى هما الخبيران بالدواء و بنفعه و ضرره .
- لا تقطع مدة العلاج المحددة لك من تلقاء نفسك .
- لا تكرر صرف الدواء بدون وصفة طبية .

لا تترك الأدوية فى متناول أيدي الأطفال