

الأسم التجارى: ستريم "أقراص و معلق "

التركيب:

يحتوى كل قرص على:

400 مجم سلفاميثوكسازول

80 مجم ترای میثوبریم

يحتوى كل 5 مل من المعلق على :

200 مجم سلفاميثوكسازول

40 مجم ترای میثوبریم

الصفات الدوائية:

يعد ستريم مركبا مضادا للبكتيريا يثبط سلفاميثوكسازول التشيد البكتيري لحامض داي هيدروفوليک عن طريق التنافس مع حامض بار أمينوبنزويك . يغلق ترای میثوبریم انتاج حامض تيتراهيدروفوليک من داي هيدروفوليک عن طريق الارتباط والتثبيط المنعكش لأنزيم داي هيدروفولات ريدكتيز . ولذلك فإن ستريم يعوق خطوتين متتاليتين في تشيد الأحماس النوية والبروتينات الضرورية للعديد من البكتيريا . يشمل مجال النشاط المضاد للبكتيريا لدواء ستريم الجراثيم المألوفة في المسالك البولية باستثناء ميكروب سودوموناس ايروجينوزا ، البكتيريا المسبة للأمراض التي تم عزلها من افراز الأذن الوسطى وافراز الشعب الهوائية والسلالات المعاوية السامة لميكروب ايشيريشيا كولاي المسبة للنزلات المعوية .

حركة الدواء:

يختص ستريم بسرعة عقب تناوله عن طريق الفم . يوجد كل من سلفاميثوكسازول و ترای میثوبریم في الدم في عدة صور إما غير مرتبطة أو مرتبطة بالبروتين أو في صورة نواتج الأيض . ويوجد سلفاميثوكسازول أيضا في صورة مرتبطة مع مواد أخرى . يرتبط ترای میثوبریم (44 % تقريبا) و سلفاميثوكسازول (70 % تقريبا) مع بروتين البلازمـا . تصل المكونات المنفردة إلى قمتها في الدم بعد ساعة إلى أربع ساعات من التناول عن طريق الفم . كما يصل متوسط نصف عمر كل من سلفاميثوكسازول و ترای میثوبریم في المصـل إلى 10 و 8 إلى 10 ساعات على التوالي . يتم إخراج سلفاميثوكسازول و ترای میثوبریم مبدئيا عن طريق الكلـى .

دوعى الاستعمال:

يوصف ستريم لعلاج الحالات الآتية :

- عدوى المسالك البولية الناتجة عن ايشيريشيا كولاي ، سلالات كلبيسيلا ، سلالات انتيروباكتـر ، مورجانيلـا مورجانـاـي ، بروـتـيس مـيرـابـيلـيس و بـروـتـيس فـولـجـارـيس .
- الالتهاب الحاد للأذن الوسطى الناتج عن السلالـات القـابلـة للاستـجـابة من ستـربـتوـكـوكـس نـيمـونـيا أو هـيمـوفـيلـيس انـفـلوـنـزا .
- التـقـاقـ الحـاد لـالـتـهـابـ الشـعـبـ المـزـمـنـ فـيـ الـبـالـغـينـ النـاـتـجـ عنـ السـلـالـاتـ الحـاسـسـةـ منـ ستـربـتوـكـوكـس نـيمـونـيا أو هـيمـوفـيلـيس انـفـلوـنـزا .
- الـاسـهـالـ الـذـيـ يـصـبـبـ الـمـسـافـرـينـ الـبـالـغـينـ النـاـتـجـ عنـ السـلـالـاتـ الحـاسـسـةـ المـعـوـيـةـ السـاـمـةـ لأـيشـيرـيشـيا كـولـايـ .
- النـزـلـاتـ الـمـعـوـيـةـ النـاـتـجـةـ عنـ السـلـالـاتـ القـابلـةـ لـلـاسـتـجـابةـ منـ شـيجـيلـلاـ فـاـيكـسـنـيرـىـ وـ شـيجـيلـلاـ سـوـنىـ .

موانع الاستعمال:

يمنع استعمال ستريم في الحالات التالية :

- المرضى الذين لديهم فرط حساسية لترای میثوبریم أو السلفوناميدات .
- المرضى المصابون بمرض ميجالوبلاستيك أنيمـيا النـاـتـجـ عنـ نـفـصـ الـفـوـلـاتـ .
- الـاطـفالـ الـمـرـضـىـ الـذـيـنـ يـقـلـ عـمـرـهـ عـنـ شـهـرـيـنـ .

التحذيرات :

- يجب أن يوقف استخدام ستريم عند أول ظهور لطفح جلدي أو اى علامة تدل على حدوث تفاعل ضار .
- قد تتراوح شدة التهاب القولون الغشائي الكاذب من طفيف إلى أن يكون مهددا للحياة لذلك فإنه من المهمأخذ تشخيص هذه الحالة في الإعتبار في المرضى الذين يصيّبهم إسهال مصاحب لتناول الدواء .
- وجود الكحة ، قصر التنفس ، وجود ارتشاح في الرئة هي عبارة عن تفاعلات فرط حساسية في القناة التنفسية قد تم تسجيلها مصاحبة للعلاج بالسلفوناميدات .
- يجب ألا تستعمل السلفوناميدات لعلاج العدوى الناتجة عن البكتيريا من مجموعة أ - بيتا هيموليتاك ستربتوكوكس .

الاحتياطات :

- يجب أن يعطى ستريم بحذر للمرضى الذين لديهم تلف في وظيفة الكلى أو الكبد ، وأولئك الذين عندهم نقص محتمل في الفولات (مثل كبار السن ، المرضى الذين يتناولون علاجاً مضاداً للشنجات ، المرضى المصابين بمتألمة سوء الأمتصاص ، ومرضى حالات سوء التغذية) أو في المرضى المصابين بفرط الحساسية أو الربو الشعبي أو إدمان الخمور المزمن .
- قد يحدث نزيف يعتمد في شدته على الجرعة بالنسبة للأشخاص المصابين بنقص انزيم جلوكوز - 6 فوسفات ديبيدرويجيناز .
- يجب أخذ كمية مناسبة من السوائل لمنع حدوث بلورات في البول وتكون حصوات .

تفاعلات دوائية :

- قد يحدث في المرضى كبار السن الذين يتناولون في نفس الوقت بعض مدرات البول ، خاصة الثيازيدات ، زيادة في حدوث نقص الصفائح الدموية .
- قد يطيل ستريم ز من البروثرومبين عند تناوله مترافقاً مع عقار وارفارين .
- عند أخذ ستريم في الجرعة المعتادة يزيد نصف عمر الفينيتوين بمقدار 39% وينخفض معدل التصفية الأيضية بمقدار 27% مما يؤدي إلى زيادة متحملة في تأثير الفينيتوين .
- من الممكن أن تزكي السلفوناميدات دواء ميثوتريكسات من أماكن ارتباطه ببروتين البلازمما مما يزيد من تركيز ميثوتريكسات في الدم .

الحمل :

نظراً لتدخل سلفاميتوكسازول وترابي ميثوبريم في أيض حامض الفوليك، يجب استخدام عقار ستريم في الحمل فقط إذا كانت الفوائد المحتملة تفوق المخاطر المتوقعة للجنين.

الرضاعة :

يمنع استخدام ستريم في الأمهات المرضعات .

الآثار الجانبية:

أكثر الآثار الجانبية شيوعاً لستريم تشمل اضطرابات في المعدة والأمعاء ، غثيان ،قيء ، فقدان الشهية إلى جانب تفاعلات حساسية الجلد ، نادراً ما تحدث حالات وفاة عند استخدام السلفوناميدات نتيجة للتفاعلات الشديدة والتي تشمل متألمة ستيفنس-جونسون، خلل الخلايا البشروية السام ، نخر خلايا الكبد المداهم ، نقص الكريات المحببة ، فقر الدم الالاتسيجي، اضطرابات الدم الأخرى وفرط حساسية القناة التنفسية .

زيادة الجرعة :

- علامات وأعراض زيادة الجرعة التي تم رصدها مع السلفوناميدات والترابي ميثوبريم تشمل فقدان الشهية ، الغثيان ، القيء ، الدوخة ، الصداع ، الدوار ، فقدان الوعي وتنبيط نخاع العظام، حمى، دم في البول ويرقان.

- تشمل المبادئ الأساسية للعلاج عمل غسيل للمعدة أو القئ ، تناول كميات كبيرة من السوائل عن طريق الفم ، واعطاء سوائل في الوريد اذا كان خروج البول ضعيفاً ووظيفة الكلى طبيعية .

الجرعة والتعاطي :

- عدوى المسالك البولية وشigellosis في المرضى البالغين والأطفال وكذلك في علاج التهاب الأذن الوسطى في الأطفال :

- البالغين : قرصان من سترييم أو أربع ملاعق صغيرة (20 مل) من معلق سترييم كل 12 ساعة لمدة 10 إلى 14 يوماً ولمدة 5 أيام في علاج شigellosis
- الأطفال : 8 مجم / كجم تراي ميثوبريم و 40 مجم / كجم سلفاميثوكساسول كل 24 ساعة ، تعطى مقدمة على جرعتين كل 12 ساعة لمدة 10 أيام ولمدة 5 أيام في علاج شigellosis.

- جرعة الأطفال : شهرين او اكثر

الجرعة كل 12 ساعة (ملعقة صغيرة)	الوزن (كم)
1 (5 مل)	10
2 (10 مل)	20
3 (15 مل)	30
4 (20 مل)	40

- جرعة المرضى ذوى التلف فى وظيفة الكلى: تعتمد الجرعة على تصفية الكرياتينين كما يلى :

الجرعة التي ينصح بها	تصفية الكرياتينين (مل / دقيقة)
تستخدم الجرعة القياسية	أكثر من 30
نصف الجرعة المستعملة	30- 15
لا ينصح بالاستخدام	أقل من 15

- 2. التفاقم الحاد لإلتهاب الشعب المزمن في البالغين :
قرصان سترييم أو أربع ملاعق صغيرة (20 مل) من معلق سترييم كل 12 ساعة لمدة 14 يوماً.

- 3. الاسهال الذي يصيب المسافرين البالغين :
قرصان سترييم أو أربع ملاعق صغيرة (20 مل) من معلق سترييم كل 12 ساعة لمدة 5 أيام .

الفئة العلاجية : مضاد للبكتيريا .

الفئة القانونية : يصرف بتذكرة طبية .

- التخزين:** الأقراص: يحفظ في مكان جاف عند درجة حرارة أقل من 30° م ، بعيداً عن الضوء.
المعلق: يحفظ بعيداً عن الضوء عند درجة حرارة أقل من 30° م

العبوة :

- أقراص : علب تحتوي على 10، 20 ، 200 ، 1000 قرص .
معلق : زجاجة تحتوى على 100 مل .