

الاسم التجارى: أوميبرال كبسول 20 مجم

- الرجاء قراءة هذه النشرة بعناية قبل البدء فى تناول الدواء.
 - حافظ على هذه النشرة. قد تحتاج لقراءتها مرة أخرى.
 - إذا كان لديك أي أسئلة أخرى ، إسأل طبيبك أو الصيدلي.
 - تم وصف هذا الدواء لك. لا تعطيه لآخرين ، فربما يضرهم ، حتى لو كان لديهم نفس الأعراض.
 - إذا أصبح أي من الآثار الجانبية شديدا ، أو إذا لاحظت أي آثار جانبية غير المدرجة في هذه النشرة ، يرجى إخبار الطبيب أو الصيدلي.
- في هذه النشرة :
- 1. ما هو أوميبرال كبسول و فيم يستخدم
 - 2. قبل أن تتناول أوميبرال كبسول
 - 3. كيف تتناول أوميبرال كبسول
 - 4. الآثار الجانبية المحتملة
 - 5. كيفية تخزين أوميبرال كبسول

1. ما هو أوميبرال كبسول و فيم يستخدم؟

أوميبرال كبسول يحتوي على دواء يدعى أوميبرازول الذي ينتمي إلى مجموعة من الأدوية تسمى 'مثبطات مضخة البروتون'. وهي تعمل عن طريق تقليل كمية الحمض الذي تنتجه المعدة.

يستخدم أوميبرال كبسول لعلاج الحالات التالية :

• مرض الإرتجاع المعدى المرئي

- عسر الهضم الحمضي الذي يمكن أن يسبب آلام في المعدة أو عدم الراحة (عسر الهضم).
- القرح المصحوبة بعديو البكتيريا التي تسمى 'هليكوباكتر بيلورى'. إذا حدثت لديك هذه الحالة، قد يصف الطبيب أيضاً المضادات الحيوية لعلاج العدوى ، والسماح للقرحة بالإلتام.
- قرحة المعدة أو الأمعاء. إذا كان لديك قرحة في الماضي و تحتاج لتناول دواء من الأدوية المضادة للالتهاب غير الستيرويدية ، أوميبرال كبسول يمكن أن يوقف تكوين القرحة أو الشفاء من قرحة كانت موجودة بالفعل.
- وجود زيادة في الحمض أكثر مما ينبغي في المعدة نتيجة زيادة النمو في البنكرياس (متلازمة زولينجر إليسون).
- منع ضرر الرئتين الناتج عن استنشاق السوائل من المعدة. يمكن أن يحدث ذلك خلال عملية جراحية.

مزيد من المعلومات حول القرحة و مرض الإرتجاع المعدى المرئي :

ما هي القرحة؟

القرحة هي قطع أو ثقب في بطانة المعدة أو الأمعاء.

ما الذي يسبب القرحة؟

- عادة يكون هناك توازن بين حماية بطانة المعدة أو الأمعاء والضرر الناتج من الحمض الذي تفرزه المعدة. تحدث القرح عند زيادة إفراز الحمض أو عدم وجود حماية كافية.
- المسكنات المضادة للالتهاب غير الستيرويدية قد تسبب أحياناً القرح. إذا كان لديك قرحة في الماضي ، و تحتاج أن تأخذ الأدوية المضادة للالتهاب غير الستيرويدية ، قد يصف الطبيب

أوميرال كبسول لحماية المعدة أو الأمعاء.

- نوع من البكتيريا تسمى 'هليكوباكتر بيلورى' يمكن أيضاً أن تسبب القرحة. فهي بكتيريا تعيش في بطانة الواقية للأمعاء. ليس معروفاً لماذا يصاب بها بعض الناس ، والبعض الآخر لا يصاب. إذا كان حدث لديك قرحة و حدثت عدوى ببكتيريا 'هليكوباكتر بيلورى' ، قد يصف الطبيب المضادات الحيوية لعلاج العدوى ، والسماح للقرحة باللتئام.

ما هو مرض الإرتجاع المعدى المريئي؟

ذلك هي الحالة التي يهرب فيها الحمض من المعدة إلى المريء. المريء ليس به بطانة واقية. لذلك عندما يصل الحمض إلى المريء ، فإنه يمكن أن يسبب الألم ، الالتهاب والحرقة.

ماذا يجب ان تفعل إذا كنت مازلت تشعر بنفس الاعراض؟
تحدث مع طبيبك فقد يراجع حالتك و العلاج الذى تتناوله.

كيف يمكنني أن أساعد نفسي في التخفيف من الأعراض؟
إذا كان لديك مرض الإرتجاع المعدى المريئي ، قرحة أو عسر الهضم الحمضي ، فضلا عن اتخاذ أوميرال كبسول ، قد تساعدك الآتى :

- لا تأكل قبل الذهاب إلى السرير مباشرة. أيضا ، حاول رفع رأسك أثناء النوم مسافة 20 سم.
- انقاص الوزن إذا لزم الأمر وعدم ارتداء ملابس ضيقة.
- التوقف عن التدخين.
- التقليل من أكل الدهون والزيادة من البروتين.
- لا تتناول الكافيين ، الكحول ، الطماطم أو الطعام الحار الساخن – فقد يزيد ذلك من شدة الأعراض .

2. قبل أن تتناول أوميرال كبسول

كسور في العظام

نشرت العديد من الدراسات أن العلاج بمثبتات مضخة البروتون قد يصاحبها زيادة في خطر حدوث كسور بالمعصم، الفخذ أو العمود الفقري نتيجة هشاشة العظام. تزيد مخاطر الإصابة بالكسور في المرضى الذين تلقوا جرعات عالية، مثل جرعات يومية متعددة ، وكذلك العلاج لفترات طويلة بهذه الأدوية (سنة أو أكثر).

يجب على المرضى استخدام أقل جرعة مناسبة وأقصر مدة ممكنة للحالة التي يتم علاجها. ينبغي متابعة المرضى المعرضين لخطر كسور العظام الناتجة عن هشاشة العظام وفقا لإرشادات العلاج المتبعة.

- قد تسبب مجموعة الأدوية التي تسمى 'مثبتات مضخة البروتون' انخفاضاً في مستويات الماغنيسيوم في مصل الدم (نقص ماغنيسيوم الدم) إذا ما تم تناولها لفترات طويلة من الزمن (في معظم الحالات، أكثر من سنة واحدة)، لم تحسن مكممات الماغنيسيوم وحدتها مستويات الماغنيسيوم المنخفضة في المصل و لذلك يلزم وقف العلاج بمثبتات مضخة البروتون.

قد يؤدي انخفاض مستويات الماغنيسيوم في المصل إلى حدوث تأثيرات سلبية خطيرة بما في ذلك تشنج العضلات (تكزز)، عدم انتظام ضربات القلب، والتشنجات ، ولكن لا تحدث هذه الأعراض دائمًا. يتطلب علاج نقص ماغنيسيوم الدم عموماً تناول مكممات الماغنيسيوم. كما قد يتطلب أيضاً

العلاج في المرضى الذين يتناولون مثبطات مضخة البروتون والذين لديهم نقص في ماغنيسيوم الدم وقف العلاج بمثبطات مضخة البروتون.

لَا تأخذ أوميبرال كبسول إذا :

- كان لديك حساسية من الأوميبرازول أو لأي من المكونات الأخرى لهذا الدواء.
- كنت تتناول دواء يدعى اتازانافير (المستخدم في علاج فيروس نقص المناعة البشرية).

إذا كنت غير متأكد ، تحدث إلى الطبيب أو الصيدلي قبل تناول أوميبرال كبسول.

اتخذ عناء خاصة مع أوميبرال كبسول

- إذا كان لديك أي مشاكل في الكبد. وذلك لأن الطبيب قد يقلل من الجرعة التي تتناولها.

تناول أدوية أخرى

يرجى إخبار الطبيب أو الصيدلي إذا كنت تأخذ ، أو تناولت في الآونة الأخيرة ، أي أدوية أخرى. وهذا يشمل الأدوية التي تشتريها بدون وصفة طبية. وذلك لأن أوميبرال كبسول يمكن أن يؤثر على طريقة عمل بعض الأدوية وبعض الأدوية يمكن أن يكون لها تأثير على أوميبرال كبسول.

لا تأخذ أوميبرال كبسول إذا كنت تتناول الأدوية التالية :

- اتازانافير (المستخدم في علاج فيروس نقص المناعة البشرية).

إخبر الطبيب أو الصيدلي إذا كنت تتناول أي من الأدوية التالية :

- كيتوكونازول ، ايتراكونازول أو فوريكونازول (التي تستخدم لعلاج العدوى الفطرية).
- ديازيبام (التي يستخدم لعلاج القلق ، باسط العضلات أو لعلاج الصرع).
- فينيتوين (المستخدمة في علاج الصرع). إذا كنت تأخذ فينيتوين ، سوف يحتاج طبيبك إلى مراقبتك عند بدء أو التوقف عن تناول أوميبرال كبسول.
- الأدوية التي تستخدم في منع تجلط الدم ، مثل الوارفارين أو غيرها من غالفات مستقبلات فيتامين ك. قد يحتاج طبيبك إلى مراقبتك عند بدء أو التوقف عن تناول أوميبرال كبسول.
- الديجوكتسين (الذي يستخدم في علاج مشاكل في القلب).
- تاكروليماس (الذي يستخدم في عمليات زرع الأعضاء).

الحمل والرضاعة

قبل تناول أوميبرال كبسول ، أخبر طبيبك إذا كنت حاملا ، تحاولين أن تصبحي حاملا أو أنك أما مرضعة. سوف يقرر طبيبك إذا كان ممكنا أن تأخذين أوميبرال كبسول خلال هذا الوقت.

القيادة واستخدام الآلات

لا يؤثر أوميبرال كبسول على قدرتك على القيادة أو استخدام آلات.

معلومات هامة عن أحد مكونات أوميبرال كبسول

تحتوي كبسولات أوميبرال على لاكتوز وهو نوع من السكريات، إذا كان لديك حساسية من بعض السكريات استشر طبيبك قبل تناول الدواء.

3. كيف تتناول أوميبرال كبسول

يجب أن تأخذ أوميبرال كبسول تماما كما وصفه الطبيب. يجب مراجعة الطبيب أو الصيدلي إذا كنت غير متأكد.

تناول الدواء:

- يمكنك أن تأخذ الكبسولات في أي وقت من اليوم.
- يمكنك أن تأخذ الكبسولات مع الطعام أو على معدة فارغة.
- يجب بلع الكبسولات صحيحة مع كوب من الماء. لا تمضغ أو تسحق الكبسولات، وذلك لأن الكبسولات تحتوي على كريات مغلفة التي تمنع الدواء من التكسير بسبب الحمض الموجود في المعدة. فمن المهم عدم سحق الكريات.

ماذا تفعل إذا كان لديك صعوبة في بلع الكبسولات

إذا وجدت أنت أو طفلك صعوبة في بلع الكبسولات ، يمكنك القيام بأحد الإجراءات التالية :

- فتح وابتلاع محتويات الكبسولات مع نصف كوب من الماء.
- أو يمكن لك مزج المحتويات مع 2 ملعقة شاي من المياه (غير الغازية).
- بلطف قم بمزج هذا الخليط مع كمية صغيرة من عصير الفواكه الحمضية (مثل البرتقال والتفاح أو الأناناس) أو إلى صلصة التفاح أو الزبادي.
- ثم اشرب المزيج على الفور أو في غضون 30 دقيقة. يقلب الخليط دائمًا قبل شربه.
- للتأكد من أنك تناولت كل الدواء ، اشطف الكوب جيداً بنصف كوب من الماء واشربه. القطع الصلبة تحتوي على الدواء .
- يجب عدم مضغ أو سحق الكبسولات.
- أو يمكن لك أو لطفلك مص الكبسولات. ثم شرب نصف كوب من الماء.

ما هي الكمية التي يجب أن تتناولها من الدواء

- طبيبك هو الذي سيحدد لك عدد الكبسولات و مدة تناولها . وهذا يعتمد على حالتك ، و عمرك وكفاءة عمل الكبد .
- الجرعات المعتادة هي كالتالي:

*** قرحة الاثني عشر ، قرحة المعدة الحميدة ، القرحة بعد إجراء الجراحة والقرح المتكررة:**

الجرعة المعتادة

للعلاج قصير الأجل، الجرعة اليومية المعتادة هي 20 مجم و يمكن زيتها إلى 40 مجم مرة واحدة يوميا في الحالات الشديدة أو التي لا تستجيب بسهولة للعلاج. جرعة واحدة يوميا من 20 مجم قبل الإفطار أو قبل وجبة العشاء تمنع إفرازات المعدة لمدة 16 إلى 18 ساعة .
يمكن مضاعفة هذه الجرعة إذا كانت الإستجابة غير مرضية.

مدة العلاج :

قرحة الاثني عشر : 4 أسابيع على الأقل.
قرحة المعدة : 6- 8 أسابيع على الأقل.

*** قرحة الاثني عشر المصحوبة بكتيريا 'هليكوباكتر بيلورى' :**

الجرعة المعتادة

40 مجم يوميا مع 1.5 جم (750 مجم مرتين يوميا) من أموكسيسيليدين لمدة أسبوعين. وقد استخدم أموكسيسيليدين في التجارب الإكلينيكية بجرعات تصل إلى 2 جم/يوم.

***الإرتجاع المعدى المريئي/ التهاب و تأكل المريء:**

الجرعة اليومية المعتادة : 20 الى 40 مجم اعتمادا على شدة المرض.
مدة العلاج : من 4 إلى 8 أسابيع ، اعتمادا على شدة المرض.

في بداية العلاج ، وفي حالة استمرار الألم ، يمكن وصف مضادات الحموضة. سواء في القرحة المغوية المتكررة والإرتجاع المعدى المريئي المزمن، إعطاء 20 مجم من أوميبرازول لمدة 3 أيام من كل أسبوع بإستمرار، بدلا من العلاج اليومي بغالقات مستقبلات- H2 ، بعد بدila جيدا.

*** التهاب المعدة ، الحموضة :**
جرعة البالغين الموصى بها : 40-20 مجم مرتين يوميا.
مدة العلاج : عادة ما يكفي 1-2 أسبوع.

*** متلازمة الاستنشاق لدى الأطفال حديثي الولادة :**
40 مجم تعطى في الليلة السابقة ومرة أخرى صباح يوم عملية الولادة الفيصرية و ذلك يزيد الرقم الهيدروجيني في المعدة على نحو فعال ويقلل من حجم إفرازات المعدة.

*** متلازمة زولينجر إليسون :**
الجرعة اليومية : 60 مجم ، وينبغي تعديل الجرعة حسب احتياجات المريض وينبغي أن تستمر حسب الدواعي الإكلينيكية. يمكن استخدام جرعات من 20 مجم إلى 120 مجم يوميا حسب شدة المرض.
وقد استخدمت جرعات تصل إلى 360 مجم / يوم في المرضى الذين يعانون من مرض شديد.
مع الجرعات الزائدة عن 80 مجم يوميا ، يجب تقسيم الجرعة بالتساوي على مرتين يوميا.

تعليمات خاصة بالجرعة:
- كبسولات أوميبراز تكون أكثر فاعلية عندما تؤخذ مع أو قبل وجبات الطعام بوقت قصير ؛ من المرجح أن يكون هناك خطر كبير على فاعلية الدواء إذا تم تناوله خلال الصيام لفترات طويلة.
- ينبغي عدم تناول أوميبراز بالتزامن مع دواء آخر يعمل على تقليل إفرازات المعدة.
توصف جرعات أعلى أو زيادة في عدد مرات التناول إذا كانت هناك حاجة لزيادة الفاعلية المضادة للإفراز المعدني.

القصور الكلوي :
ليست هناك حاجة إلى تعديل الجرعة.
القصور الكبدي :
ينبغي تعديل الجرعة، الجرعة اليومية القصوى هي 20 مجم.
في معظم المرضى ، فإن جرعة 20 مجم لن تصبح فعالة تماما إلا بعد مرور حوالي 4 أيام من العلاج. استمرار تناول غالقات مستقبلات- H2 قد يأتي بنتائج عكسية سلامة و فاعلية الدواء في المرضى كبار السن مشابهة لتلك التي تظهر في المرضى الأصغر سنا.

إذا تناولت أوميبراز كبسول أكثر مما يجب
إذا تناولت أوميبراز كبسول أكثر من الذي حدده الطبيب ، تحدث إلى طبيبك أو الصيدلي فورا.
إذا نسيت أن تتناول أوميبراز كبسول
• إذا نسيت أن تأخذ جرعة من أوميبراز ، تناولها فورا عندما تتذكر ، ولكن ، إذا كان ذلك هو وقت الجرعة التالية تقريرا ، تخطي الجرعة التي نسيتها.
• لا تأخذ جرعة مضاعفة (جريتين في نفس الوقت) لتعويض الجرعة المنسية.

مثل جميع الأدوية ، يمكن أن يسبب أوميبرال كبسول بعض الآثار الجانبية ، ولكنها لا تحدث لدى الجميع. هذه الآثار الجانبية عادة تكون خفيفة وتخفيقى عند التوقف عن تناول الدواء. إذا لاحظت أي من الآثار الجانبية الخطيرة التالية ، توقف عن تناول أوميبرال كبسول وأخبر الطبيب أو اذهب إلى أقرب مستشفى :

- تورم في اللسان ، الشفتين والحلق ، حمى أو أريز في التنفس (تفاعلات حساسية شديدة).
 - أحمرار الجلد مع ظهور بثور أو قشور. قد يكون هناك أيضا تقرحات ونزيف حاد في الشفتين ، العينين ، الأنف ، الفم والأعضاء التناسلية. وقد تكون هذه أعراض 'متلازمة ستيفن جونسون' أو 'انحلال البشرة السمي'.
- هذه التأثيرات نادرة ، و تؤثر على أقل من 1 في 1000 شخص.

الآثار الجانبية الأخرى تشمل ما يلي :

آثار شائعة (تؤثر على أقل من 1 في 10 أشخاص)
• الصداع.

- تأثيرات على المعدة أو الأمعاء : آلام في المعدة ، والإمساك والإسهال وغازات (انتفاخ البطن).
- الشعور بالغثيان أو التقيؤ.

آثار غير شائعة (تؤثر على أقل من 1 في 100 شخص)

- اضطراب النوم (الأرق).
- الدوخة.
- الشعور بالوخز مثل "الإبر والدبابيس".
- الشعور بالنعاس.
- الشعور بالدوار.
- دوخة أو إغماء.
- طفح جلدي ، والطفح الجلدي العقدي ، حكة في الجلد والتهاب الجلد.
- تغيرات في فحوصات الدم التي تظهر مدى كفاءة عمل الكبد.
- الشعور بالإعياء.

آثار نادرة (تؤثر على أقل من 1 في 1000 شخص)

- جفاف الفم أو الحلق.
- عدوى فطرية تؤثر على الفم أو المريء .
- تغيرات في التذوق.
- الشعور بالقلق ، والإرتباك أو الاكتئاب.
- العدوانية.
- رؤية ، سمع أو الشعور باشياء ليست موجودة (الهلوسة).
- طفح جلدي عند التعرض لأشعة الشمس.
- عدم وضوح الرؤية.
- فقدان الشعر (ثعلبة).
- تورم و ألم في المفاصل.
- ألم أو ضعف العضلات.
- زيادة التعرق.
- مشاكل في الكلى.
- مشاكل في الكبد ، بما في ذلك اليرقان الذي يمكن أن يسبب البشرة الصفراء والبول الداكن

والتعب .

- مشاكل الكبد الشديدة التي قد تؤدي إلى الفشل الكبدي والتهاب المخ.
- تضخم الثديين عند الرجال.
- عدم القدرة على الانتصار (عجز).
- انخفاض مستويات الصوديوم في الدم وهذا قد يسبب الضعف ، التقيؤ والتشنجات.
- مشاكل في الدم مثل انخفاض عدد كرات الدم البيضاء أو الصفائح الدموية الذي يمكن أن يسبب الضعف ، كدمات أو سهولة الإصابة بالعدوى.

لا تشعر بالقلق من هذه القائمة من الآثار الجانبية المحتملة. ربما لا يحدث لك أي منها. إذا أصبحت أي من الآثار الجانبية خطيرة ، أو إذا لاحظت أي آثار جانبية غير المدرجة في هذه النشرة ، يرجى إخبار الطبيب أو الصيدلي.

تقارير ما بعد التسويق:
تأثيرات على العضلات و العظام : كسور بالعظام

5. كيفية تخزين أوميبرال كبسول

- احفظ الدواء بعيدا عن متناول وبصر الأطفال.
- لا تقم بتخزين الدواء في درجة حرارة أكثر من 30 درجة مئوية.
- حافظ على الكبسولات في العبوة الأصلية.
- لا تأخذ الكبسولات بعد تاريخ انتهاء الصلاحية المبين على العبوة. تاريخ الإنتهاء يشير إلى اليوم الأخير من ذلك الشهر.

6. ما هي المكونات الأخرى في كبسولات أوميبرال؟

أوميبرازول، مانيتول، هيدروكسى بروبيل سيليلولوز، ميكروكريستاللين سيليلولوز، لاكتوز لا مائى، صوديوم لاورايل سالفات، داى صوديوم هيدروجين فوسفات دايهيدرات، هيدروكسى بروبيل ميثيل سيليلولوز، هيدروكسى بروبيل ميثيل سيليلولوز فثالات، سيتيل الكحول.