

الإسم التجارى: بينافين كريم

الإسم العلمى: تيربينافين هيدروكلورايد

بيان التركيب:

تحتوى كل 100 جم على:	تيربينافين هيدروكلورايد
1 جم	سيتوماكروجول 1000
1.8 جم	كحول سيتوستيارايل
7.2 جم	بارافين سائل
6 جم	بارافين أبيض
15 جم	كلوروكريسول
0.1 جم	صوديوم هيدروكسيد
0.125 جم	بروبيلين جليكول
5 جم	

الشكل الصيدلى: كريم

الصفات الدوائية:

بينافين عقار مضاد للفطريات واسع المجال. فى التركيزات القليلة، بينافين له تأثير قاتل للفطريات مثل الفطريات الجلديه، العفن، الفطريات مزدوجة الشكل. أما تأثيره ضد الخمائر فيكون إما قاتل أو موقف للنمو اعتمادا على نوع الخميرة. يؤثر بينافين على تصنيع الستيرول الخاص بالفطر عن طريق تثبيط إنزيم سكوالين ايبوكسيديز فى غشاء الخلية. و ينتج عن تثبيط هذا الإنزيم نقص فى الإرجوستيرول و تراكم السكوالين داخل الخلية مما يؤدي إلى موت الفطر.

حركية الدواء:

يبدأ بينافين كريم مفعوله سريعا و يستقر بصورة مكثفة فى الجلد. تمتص أقل من 5% من الجرعه بعد الإستعمال.

دواعى الإستعمال:

- يستعمل بينافين كريم فى علاج:
- عدوى الفطريات الجلدية الناتجة عن الإصابة بفطريات الجلد مثل الفطريات الشعرية المتفرعة، وايضا عدوى الجلد الناتجة عن الإصابة بالخمائر و الكانديدا (كانديدا البيكانز).
 - التينيا المبرقشة الناتجة عن الإصابة بمالاسيزيا فرفر.

الجرعة والتعاطى:

- قد يستعمل بينافين كريم مرة أو مرتين يوميا.
- يجب تنظيف المناطق المصابة وتجفيفها قبل وضع بينافين كريم.
- توضع طبقة رقيقة من بينافين كريم على المناطق المصابة والأجزاء المحيطة بها وتلك برفق.

- فى حالة العدوى التى تسبب سحجات (تحت الثدى، ما بين الأصابع، بين الفخذين، إربى)،
يجب تغطية الكريم بشاش وخاصة اثناء الليل.

- تعتمد مدة العلاج على نوع وشدة العدوى.

نوع العدوى	مدة العلاج
تينيا القدمين	اسبوع واحد
تينيا الجسد / الفخذ	اسبوع واحد
داء المبيضات الجلدى	1 - 2 اسبوع
تينيا متعددة الألوان	اسبوعين

موانع الإستعمال:

يمنع استعمال بينافين كريم فى المرضى الذين لديهم حساسية لتيربينافين أو أى من مكونات المستحضر.

الآثار الجانبية:

قد يحدث احمرار، حكة، احساس بلسعة فى مكان وضع الكريم، ونادرا ما تستدعى هذه الآثار الجانبية وقف استخدام الدواء.
يجب التفرقة بين هذه الآثار الجانبية الطفيفة وبين تفاعلات الحساسية (مثل انتشار الطفح الجلدى و / أو احمرار، ارتيكاريا، أوديما وعائية) وهذه التفاعلات نادرا ما تحدث ولكن فى حالة حدوثها يجب وقف استخدام الدواء.

الرضاعة:

يجب على السيدات المرضعات تحاشى وضع بينافين كريم على الثدى.

الاحتياطات والتحذيرات:

- بينافين كريم للإستعمال الخارجى فقط.
يجب تحاشى ملامسة الكريم للعين.
فى حالة تلامس الكريم للعين عن طريق الخطأ، يجب غسل العين بالماء واستشارة الطبيب فى حالة ظهور أى اعراض واستمرارها.
- يجب استخدام بينافين كريم بحذر اثناء الحمل والرضاعة.

الفئة العلاجية: مضاد للفطريات.

الفئة القانونية: يصرف بتذكرة طبية.

تحذير لاتباع الإستعمال الجيد للدواء (ان هذا الدواء) - الدواء مستحضر يؤثر على صحتك و استهلاكه خلافا للتعليمات يعرضك للخطر . - أتبع بدقة وصفة الطبيب و طريقة الإستعمال المنصوص عليها و تعليمات الصيدلى الذى صرفها لك . - فالطبيب و الصيدلى هما الخبيران بالدواء و ينفعه و ضرره . - لا تقطع مدة العلاج المحددة لك من تلقاء نفسك . - لا تكرر صرف الدواء بدون وصفة طبية . لا تترك الأدوية فى متناول أيدى الأطفال
--