

الاسم التجاري: التراكاين جل

بيان التركيب:

يحتوى كل جرام جل على:

ليدوكاين (قاعدة)

50 مجم

الصفات الدوائية:

يعتبر التراكاين مخدرا موضعيا من النوع الأميدى و هو يعمل على استقرار الأغشية العصبية عن طريق تثبيط التدفق الأيونى اللازم لبدء وتوصيل الدفعات العصبية .

حركية الدواء:

ترتبط كمية الليدوكاين الممتصة من التراكاين جل ارتباطا مباشرا بمدة التعرض للجل ومساحة المنطقة التى يوضع عليها الجل .
يتم أيض ليدوكاين بسرعة فى الكبد وتكون لنواتج هذا الأيض صفات دوائية مشابهة ولكنها أضعف من الليدوكاين .

دواعى الاستعمال:

يستعمل التراكاين جل فى :

- تخفيف الآلام المصاحبة للجروح و السحجات الصغيرة بالجلد .
- الحروق البسيطة التى تشمل الحروق الناتجة عن الشمس .
- تهيج الجلد .
- لدغات الحشرات .
- الآلام والحكة الموضعية .
- الالتهابات والحرقان المصاحب لأمراض الشرج والمستقيم .
- البواسير .

موانع الاستعمال:

يمنع استعمال التراكاين جل فى المرضى الذين لديهم تاريخ حساسية للمخدرات الموضعية من النوع الأميدى أو لأى مركب آخر فى المستحضر .

الاحتياطات:

- من الممكن أن يمتص التراكاين جل من خلال الأغشية المخاطية للمستقيم ، لذلك يجب تحاشي وضع طبقة سميكة من التراكاين جل خصوصا فى الأطفال .
- يجب استعمال التراكاين جل بحذر فى المرضى الذين يعانون من حالات مرضية حادة أو المصابون بالوهن والمرضى كبار السن لأنهم أكثر عرضة للإصابة بتأثيرات الليدوكاين.
- يجب توخى الحذر عند استعمال التراكاين جل على مساحات كبيرة من الجسم وتركه لمدة أكثر من ساعتين .

الحمل:

يستعمل التراكاين جل فى الحمل فى الحالات الضرورية فقط.

الرضاعة:

يجب توخى الحذر عند استعمال التراكايبين جل فى الأمهات المرضعات و ذلك لأن ليدوكايبين يفرز فى اللبن.

التحذيرات:

- يوصف التراكايبين جل للإستعمال الخارجى فقط ، ويجب تجنب ملامسته للعين
- لا يستعمل التراكايبين جل على الجلد المتهيج أو اذا حدث تهيج للجلد بعد وضعه
- يجب وقف استعمال التراكايبين جل واستشارة الطبيب اذا استمرت الحالة أكثر من سبعة أيام أو اذا تحسنت الحالة ثم تكررت ثانية بعد بضعة أيام .
- لا يستعمل التراكايبين جل اذا كان الجلد مصابا بالبثور أو التسلخات .
- قد يؤدي استخدام التراكايبين جل على مناطق كبيرة من الجسم أو لمدة طويلة الى امتصاص ليدوكايبين بدرجة كبيرة مما ينتج عنه آثار جانبية خطيرة .

الآثار الجانبية:

- تفاعلات موضعية: من الممكن حدوث أوديميا أو احمرار بالجلد أثناء استعمال التراكايبين جل أو بعد استعماله مباشرة .
- من الممكن حدوث حساسية عند استعمال التراكايبين جل .

تفاعلات دوائية:

يجب توخى الحذر عند استعمال التراكايبين جل مع الادوية التى تعالج عدم انتظام ضربات القلب –القسم الأول(مثل توكاينيد وميكزليتيتين) حيث من الممكن أن تزيد الآثار الضارة .

زيادة الجرعة:

يصل ليدوكايبين الى قمة مستواه فى الدم ويكون 0.05 الى 0.16 ميكروجرام / مل بعد وضع 60 جرام من التراكايبين جل على مساحة 400 سم² من الجسم لمدة 3 ساعات . عندما يصل تركيز ليدوكايبين الى المستوى السام (< 5 ميكروجرام / مل) يتسبب عنه انخفاض فى نتاج القلب ، المقاومة الطرفية الكلية ومتوسط ضغط الدم الوريدي .

الجرعة والتعاطى:

وضع طبقة من التراكايبين جل على الجلد السليم أو حسب ارشادات الطبيب .

الفئة العلاجية:

مخدر موضعى .

الفئة القانونية:

لا يصرف بتذكرة طبية .

التخزين:

يحفظ عند درجة حرارة أقل من 30 ° م .

العبوة: أنابيب تحتوى كل منها على 20 جم جل .

تحذير لاتباع الاستعمال الجيد للدواء

(ان هذا الدواء)

- الدواء مستحضر يؤثر على صحتك و استهلاكه خلافا للتعليمات يعرضك للخطر .
- أتبع بدقة وصفة الطبيب و طريقة الاستعمال المنصوص عليها و تعليمات الصيدلى الذى صرفها لك .
- فالطبيب و الصيدلى هما الخبيران بالدواء و بنفعه و ضرره .
- لا تقطع مدة العلاج المحددة لك من تلقاء نفسك .
- لا تكرر صرف الدواء بدون وصفة طبية .

لا تترك الأدوية فى متناول أيدي الأطفال