

الاسم التجاري: الترا- ميدانين دهان

بيان التركيب:

كل 15 مل تحتوى على:

ميثوكساليين (امويدين)

0.03 جم

الصفات الدوائية:

دهان الترا- ميدانين يتراوح لونه من عديم اللون إلى الأصفر الفاتح، ويحتوى على مركب ميثوكساليين الذى يزيد الحساسية للضوء، وبذلك فإن استعمال الدواء على الجلد ثم التعرض للأشعة فوق البنفسجية يؤدي إلى احداث الضرر بالخلايا. والضرر الذى يلحق بالخلايا يتسبب فى حدوث تفاعل التهابى . ومن اكثر علامات هذا التفاعل هو حدوث حمامى (طفح وردى) والذى قد لا يبدأ إلا بعد عدة ساعات وقد لا يصل إلى اعلى مستوى لمدة 2 – 3 ايام أو اكثر. وهذا التفاعل الحمامى يتبعه اصلاح للجلد بعد ايام أو اسابيع ويظهر هذا الإصلاح على شكل زيادة فى الميلانين فى البشرة وزيادة فى سمك الطبقة القرنية.

دواعى الاستعمال:

يستعمل دهان الترا- ميدانين كعلاج موضعى لإعادة صبغة الجلد فى حالات البهق وذلك مع جرعات من الأشعة فوق البنفسجية (320 – 400 نانومتر) أو اشعة الشمس.

موانع الاستعمال:

يمنع استعمال دهان الترا- ميدانين فى:

- المرضى الذين لديهم استعداد ذاتى لحدوث تفاعلات أو تاريخ حساسية لمركبات السورالين.
- المرضى الذين لديهم ميلانوما أو تاريخ مسبق لحدوث ميلانوما بالجلد.
- المرضى الذين لديهم ورم سرطانى بالجلد.
- المرضى الذين لديهم حساسية للضوء مثل بورفيريا، الذئبة الحمراء الحادة، زيروديرما بيجمنتوزم، الخ..
- الاطفال أقل من 12 عام.

الآثار الجانبية:

اكثر الآثار الجانبية شيوعا هى حدوث حروق شديدة فى اجزاء الجسم المعالجة نتيجة التعرض الزائد للأشعة فوق البنفسجية والتي تشمل أشعة الشمس.

التحذيرات والاحتياطات:

- دهان الترا- ميدانين دواء قوى وقد يسبب حروق شديدة إذا لم يحسن استخدامه.
- يجب استعمال هذا الدواء تحت اشراف الطبيب وفى ظروف محكمة من التعرض للضوء ويليها يجب الحماية من الضوء.
- يجب تغطية المكان المعالج أو وضع دواء واقى من اشعة الشمس بعد التعرض للجرعات العلاجية من أشعة الشمس.

الحمل:

يستعمل دهان الترا- ميدانين فى الحمل فقط عند الضرورة.

الرضاعة:

يجب توخى الحذر عند استعمال الأم المرضعة لدهان الترا- ميدانين.

الجرعة والتعاطى:

يوضع دهان الترا- ميدانين تحت اشراف الطبيب على مكان محدد من البهق ثم يعرض هذا المكان لمصدر مناسب من الأشعة فوق البنفسجية.
زمن التعرض الأول يجب أن يكون محدد وألا يزيد عن الوقت المتوقع لحدوث الطفح الوردى (الحمامى) بمرّة ونصف.

الفئة العلاجية:

دواء لعلاج مرض جلدى.

الفئة القانونية:

يصرف بتذكرة طبية.

العبوة:

زجاجات بكل منها 15 مل من المحلول.

التخزين:

يحفظ بعيدا عن الضوء، عند درجة حرارة أقل من 30 °م.

تحذير لاتباع الاستعمال الجيد للدواء
(ان هذا الدواء)

- الدواء مستحضر يؤثر على صحتك و استهلاكه خلافا للتعليمات يعرضك للخطر .
- أتبع بدقة وصفة الطبيب و طريقة الاستعمال المنصوص عليها و تعليمات الصيدلى الذى صرفها لك .
- فالطبيب و الصيدلى هما الخبيران بالدواء و بنفعه و ضرره .
- لا تقطع مدة العلاج المحددة لك من تلقاء نفسك .
- لا تكرر صرف الدواء بدون وصفة طبية .

لا تترك الأدوية فى متناول أيدي الأطفال