

الاسم التجاري: كبسولات سيليكوكس 200 مجم

الرجاء قراءة هذه النشرة بعناية قبل البدء في تناول الدواء.

- احتفظ بهذه النشرة. قد تحتاج لقراءتها مرة أخرى.
- إذا كان لديك أي أسئلة أخرى ، إسأل طبيبك أو الصيدلي.
- هذا الدواء تم وصفه لك. لا تعطيه للآخرين. فقد يضرهم حتى لو كانت لديهم نفس الأعراض.
- إذا أصبحت أي من الآثار الجانبية خطيرة أو مزعجة ، أو إذا لاحظت أي آثار جانبية غير المدرجة في هذه النشرة ، يرجى إخبار الطبيب أو الصيدلي.

تحذير:

مخاطر على القلب والأوعية الدموية

- قد تتسبب مضادات الالتهاب غير الستيرويدية في زيادة خطر حدوث تخثر في القلب والأوعية الدموية ، احتشاء عضلة القلب ، والسكتة الدماغية ، والتي من الممكن أن تكون قاتلة. قد يزيد هذا الخطر مع طول مدة الاستخدام. المرضى الذين يعانون من أمراض القلب والأوعية الدموية أو الذين يتعرضون لعوامل أخرى تزيد من خطر حدوث أمراض القلب والأوعية الدموية هم أكثر عرضة لهذه المخاطر.
- يمنع استخدام مضادات الالتهاب غير الستيرويدية في علاج الألم أثناء العمليات الجراحية الخاصة بتحويل مسار الشريان التاجي.

مخاطر على الجهاز الهضمي

- قد تتسبب مضادات الالتهاب غير الستيرويدية في زيادة خطر حدوث تأثيرات جانبية خطيرة بالجهاز الهضمي بما في ذلك التهابات، النزيف ، التقرح ، وثقب المعدة أو الأمعاء ، والتي من الممكن أن تكون قاتلة. ويمكن لهذه التأثيرات أن تحدث في أي وقت أثناء الاستخدام وبدون سابق إنذار. المرضى كبار السن هم أكثر عرضة لحدوث تأثيرات خطيرة بالجهاز الهضمي.

في هذه النشرة :

1. ما هو سيليكوكس وفيما يستخدم .
2. قبل أن تتناول سيليكوكس
3. كيفية تناول سيليكوكس
4. الآثار الجانبية المحتملة
5. كيفية تخزين سيليكوكس
6. مزيد من المعلومات

1. ما هو سيليكوكس وفيما يستخدم .

يستخدم سيليكوكس للتخفيف من علامات وأعراض التهاب المفاصل الروماتويدي ، التهاب العظمى المفصلي والتهاب الفقار اللاصق.

سيليكوكس ينتمي إلى مجموعة من المنتجات الدوائية تدعى مضادات الالتهابات غير الستيرويدية، وعلى وجه التحديد المجموعة الفرعية المعروفة باسم مثبطات (كوكس - 2). يفرز الجسم البروستاجلاندين الذي قد يسبب الألم والالتهاب. في حالات مثل التهاب المفاصل الروماتويدي و التهاب العظمى المفصلي

يفرز الجسم كميات أكثر من البروستاجلاندين. يعمل سيليكوكس عن طريق خفض إفراز البروستاجلاندين، مما يقلل من الألم والالتهابات.

2. قبل أن تتناول سيليكوكس

لقد وصف سيليكوكس لك من قبل الطبيب. سوف تساعدك المعلومات التالية على الحصول على أفضل النتائج مع سيليكوكس. إذا كانت لديك أي أسئلة أخرى يرجى إستشارة الطبيب أو الصيدلي.
لا تأخذ سيليكوكس إذا

أخبر طبيبك إذا كان أي من التالي صحيحا بالنسبة لك لأنه لا ينبغي أن يتناول المرضى الذين يعانون من هذه الحالات سيليكوكس :

- إذا كان لديك حساسية لمادة سيليكوكسيب أو أي من المكونات الأخرى من سيليكوكس ؛
- إذا كان لديك حساسية لمجموعة من الأدوية تسمى "السلفا" (على سبيل المثال بعض المضادات الحيوية المستخدمة لعلاج العدوى) ؛
- إذا كان لديك حاليا قرحة في المعدة أو الأمعاء ، أو نزيف في المعدة أو الأمعاء ؛
- إذا حدث لك نتيجة لتناول حامض أسيتيل ساليسيليك أو أي من مضادات الالتهابات الأخرى ، و الأدوية المسكنة للألم (مضادات الالتهاب غير الستيرويدية) ربو ، أورام حميدة في الأنف ، احتقان حاد بالأنف ، أو تفاعلات الحساسية مثل طفح وحكة في الجلد ، تورم في الوجه والشفتين واللسان أو الحلق ، و صعوبة أو صفير بالتنفس ؛
- إذا كنت حاملا. أو إذا كنت من الممكن أن تصبحي حاملا أثناء العلاج يجب أن تناقشي وسائل منع الحمل مع الطبيب ؛
- إذا كنت تقومين بالرضاعة الطبيعية ؛
- إذا كان لديك مرض شديد في الكبد ؛
- إذا كان لديك مرض شديد في الكلى ؛
- إذا كان لديك التهاب في الأمعاء من مثل التهاب القولون التقرحي أو مرض كرون؛
- إذا كان لديك قصور في القلب ، مرض نقص تروية القلب ، أو أمراض قلبية وعائية ، مثل نوبات قلبية ،سكتة دماغية، أو نوبات عابرة من نقص تدفق الدم الى المخ ، المعروف أيضا باسم " سكتة دماغية مصغرة " ، الذبحة الصدرية ، أو انسداد الأوعية الدموية في القلب أو المخ؛
- إذا كان لديك الآن أو مسبقا مشاكل في الدورة الدموية (أمراض في الشرايين الطرفية) أو خضعت لعملية جراحية في شرايين الساقين.

اتخذ عناية خاصة مع سيليكوكس

استشر طبيبك إذا كان أي من الحالات التالية تنطبق عليك :

- إذا كنت تعاني مسبقا من قرحة أو نزيف في المعدة أو الأمعاء.
- (لا تأخذ سيليكوكس إذا كان لديك حاليا قرحة أو نزيف في المعدة أو الأمعاء) ؛
- إذا كنت تتناول حمض اسيتيل الساليسيليك (حتى لو كان في جرعات منخفضة لأغراض وقائية من أمراض القلب) ؛
- إذا كنت تتناول أدوية لتقليل تخثر الدم (مثل الوارفارين) ؛
- إذا كنت تتناول سيليكوكس في نفس الوقت مع غيره من مضادات الالتهاب غير الستيرويدية غير التي تحتوي على حمض اسيتيل الساليسيليك مثل ايبوبروفين أو ديكلوفيناك. ينبغي تجنب استخدام هذه الأدوية معاً؛

- إذا كنت تدخن ، تعاني من، مرض السكري ، ارتفاع ضغط الدم أو زيادة نسبة الكوليسترول في الدم ؛
- إذا كان أى من الكبد ، القلب أو الكلى لا يعمل بشكل جيد قد يرغب طبيبك في عمل فحوصات بشكل منتظم لك ؛
- إذا حدث لك احتباس للسوائل (مثل تورم الكاحلين والقدمين) ؛
- إذا تعرضت للإصابة بالجفاف ، على سبيل المثال بسبب المرض ، الإسهال أو استخدام مدرات البول (التي تستخدم لمعالجة السوائل الزائدة في الجسم) ؛
- إذا حدثت لك تفاعلات حساسية شديدة أو تفاعلات جلدية خطيرة ناتجة عن تناول أدوية ؛
- إذا كنت تشعر بالمرض بسبب عدوى أو تعتقد أن لديك عدوى ، قد يخفى سيليكوكس الحمى أو غيرها من علامات العدوى والالتهاب ؛
- إذا كنت أكثر من 65 سنة قد يحتاج الطبيب إلى إجراء فحوصات بصورة منتظمة.

كما هو الحال مع مضادات الالتهابات غير الستيرويدية الأخرى (مثل ايبوبروفين أو ديكلوفيناك) قد يسبب سيليكوكس ارتفاع في ضغط الدم ، ولذلك قد يطلب الطبيب مراقبة ضغط الدم بانتظام. وقد أبلغ عن حدوث بعض حالات تفاعلات الكبد الشديدة بما في ذلك الالتهاب الكبدي الحاد، تلف الكبد ، قصور الكبد (أحيانا تحدث نتائج مميتة أو تحتاج الحالة الى زرع كبد. الحالات التي أبلغت عن علاقة مدة تناول الدواء نسبة لبداية ظهور هذه التفاعلات، قررت حدوث معظم التفاعلات الشديدة في الكبد خلال شهر واحد من بداية العلاج. قد يسبب سيليكوكس صعوبة في حدوث حمل، يجب عليك إبلاغ الطبيب إذا كنت تخططين أن تصبحي حاملا أو إذا كانت هناك مشاكل في حدوث الحمل .

تناول أدوية أخرى

يمكن لبعض الأدوية أن تؤثر على طريقة عمل الأدوية الأخرى. يرجى إخبار الطبيب أو الصيدلي إذا كنت تتناول أو تناولت في الآونة الأخيرة أي أدوية أخرى ، بما في ذلك الأدوية التي تناولتها بدون وصفة طبية :

- ديكستروميثورفان (الذي يستخدم في علاج السعال).
- مثبطات انزيم تحويل الأنجيوتنسين أو مضادات أنجيوتنسين-2 (التي تستخدم لعلاج ارتفاع ضغط الدم والقصور في القلب).
- مدرات البول (تستخدم لعلاج السوائل الزائدة في الجسم).
- فلوكونازول وريفامبيسين (التي تستخدم لعلاج العدوى البكتيرية والفطرية).
- وارفارين أو مضادات التخثر الأخرى عن طريق الفم .
- ليثيوم (الذي يستخدم لعلاج بعض أنواع الاكتئاب).
- الأدوية الأخرى التي تعالج الاكتئاب، اضطرابات النوم، ارتفاع ضغط الدم أو عدم انتظام ضربات القلب.
- مضادات الالتهاب (التي تستخدم لعلاج بعض الاضطرابات النفسية).
- الميثوتركسات (الذي يستخدم في علاج التهاب المفاصل الروماتويدي والصدفية وسرطان الدم).
- كاربامازيبين (الذي يستخدم في علاج الصرع / التشنجات وبعض أشكال الألم أو الاكتئاب).
- الباربيتورات (التي تستخدم في علاج الصرع / التشنجات وبعض اضطرابات النوم).
- سيكلوسبورين وتاكروليماس (التي تستخدم لتثبيط جهاز المناعة مثل بعد عمليات زرع الأعضاء).
- يمكن تناول سيليكوكس مع جرعة منخفضة من حمض اسيتيل الساليسيليك (75 مجم أو أقل يوميا). إسأل طبيبك قبل تناول الدوائين معا.

الحمل والرضاعة :

إسأل طبيبك أو الصيدلي قبل تناول أي دواء.
يجب ألا يتم تناول سيليكوكس من قبل النساء الحوامل أو اللاتي يمكن أن يصبحن حوامل (أي النساء ذوات القدرة على الإنجاب و لا يستخدمن وسائل كافية لمنع الحمل) أثناء العلاج . إذا أصبحت حاملاً أثناء العلاج بسيليكوكس يجب وقف العلاج و الإتصال بطبيبك لوصف العلاج البديل.
يجب عدم تناول سيليكوكس أثناء الرضاعة الطبيعية.

القيادة واستخدام الآلات:

يجب أن تكون على علم برد فعلك بعد تناول سيليكوكس قبل القيادة أو تشغيل الآلات. إذا كنت تشعر بالدوار أو النعاس بعد تناول سيليكوكس ، لا تقود المركبات أو تستخدم الآلات حتى تزول هذه التأثيرات.

معلومات هامة حول بعض مكونات سيليكوكس

يحتوي سيليكوكس على اللاكتوز (وهو نوع من السكر). إذا أخبرك الطبيب أن لديك عدم تحمل لبعض السكريات ، اتصل بطبيبك قبل تناول هذا الدواء.

3. كيفية تناول سيليكوكس

يجب عمل موازنة بين المنافع والمخاطر المحتملة من سيليكوكس وخيارات العلاج الأخرى قبل أخذ قرار استخدام سيليكوكس. يجب تناول أقل جرعة فعالة لأقصر مدة تتفق مع الأهداف الفردية لعلاج المريض.
لعلاج التهاب المفاصل الروماتويدي والتهاب المفاصل ، ينبغي تناول أدنى جرعة من سيليكوكس لكل مريض. ويمكن إعطاء هذه الجرعات دون اعتبار لتوقيت الوجبات.

الالتهاب العظمى المفصلي :

الجرعة الموصى بها لعلاج علامات وأعراض الالتهاب العظمى المفصلي هي كبسولة واحدة من سيليكوكس (200 مجم) مرة واحدة يوميا.

التهاب المفاصل الروماتويدي :

الجرعة الموصى بها لعلاج أعراض وعلامات التهاب المفاصل الروماتويدي هي كبسولة واحدة من سيليكوكس (200 مجم) مرتين في اليوم.

التهاب الفقار اللاصق :

الجرعة الموصى بها لعلاج أعراض وعلامات التهاب الفقار اللاصق هي كبسولة واحدة من سيليكوكس (200 مجم) مرة واحدة يوميا. إذا لم يلحظ أي تأثير بعد 6 أسابيع ينصح بتناول 400 مجم (كبسولتين من سيليكوكس). إذا لم يلحظ أي تأثير بعد 6 أسابيع من تناول كبسولتين من سيليكوكس (400 مجم يوميا) ، فمن غير المحتمل حدوث استجابة، وينبغي النظر عندئذ في خيارات العلاج البديل.

علاج الألم الحاد و عسر الطمث الابتدائي :

الجرعة الموصى بها هي 400مجم (كبسولتين من سيليكوكس) في البداية ، تليها جرعة إضافية إذا لزم الأمر كبسولة واحدة من سيليكوكس (200 مجم) في اليوم الأول. والجرعة الموصى بها في الأيام اللاحقة، هي كبسولة واحدة من سيليكوكس (200 مجم) مرتين يوميا حسب الحاجة.

فئات خاصة

مرضى القصور الكبدي :

ينبغي تخفيض الجرعة اليومية الموصى بها من كبسولات سيليكوكس في المرضى الذين يعانون من اختلال كبدي غير شديد (معتدل) بمقدار 50 ٪ تقريباً. من غير المستحسن استخدام سيليكوكس في المرضى الذين يعانون من اختلال كبدي شديد.

إذا أخذت سيليكوكس أكثر مما يجب

يجب ألا تأخذ كبسولات سيليكوكس أكثر مما وصفه الطبيب. إذا تناولت الكثير من الكبسولات اتصل بالطبيب أو الصيدلي أو المستشفى وخذ الدواء معك.

إذا نسيت أن تأخذ سيليكوكس

إذا نسيت تناول كبسولة من سيليكوكس ، تناولها عندما تتذكر. لا تأخذ جرعات مضاعفة لتعويض الجرعات المنسية.

إذا توقفت عن تناول سيليكوكس

التوقف المفاجيء عن تناول سيليكوكس قد يؤدي إلى ان تزداد الأعراض سوءاً. لا تتوقف عن تناول سيليكوكس ما لم يصف الطبيب غير ذلك. قد يطلب منك طبيبك تقليل الجرعة على مدى بضعة أيام قبل أن تتوقف تماماً. إذا كان لديك أي أسئلة أخرى عن استخدام هذا المنتج ، إسأل طبيبك أو الصيدلي.

4. الآثار الجانبية المحتملة

مثل جميع الأدوية ، قد يسبب سيليكوكس بعض الآثار الجانبية ، و لكنها لا تحدث للجميع . إذا أصبحت أي من الآثار الجانبية خطيرة ، أو إذا لاحظت أي آثار جانبية غير المدرجة في هذه النشرة ، أخبر الطبيب أو الصيدلي.

الآثار الجانبية المذكورة أدناه لوحظت في مرضى التهاب المفاصل الذي تناولوا سيليكوكس. الآثار الجانبية التي تتبعها هذه العلامة (*) و المذكورة أدناه حدثت في أعلى المعدلات في المرضى الذين تناولوا سيليكوكس لمنع ظهور أورام القولون. تناول المرضى في هذه الدراسات سيليكوكسيب بجرعات عالية ولمدة طويلة.

إذا حدث لك أي من الآثار الجانبية التالية ، توقف عن تناول سيليكوكس وأخبر الطبيب على الفور. إذا كان لديك :

- تفاعلات حساسية مثل الطفح الجلدي ، تورم في الوجه ، صعوبة أو أزيز في التنفس.
- مشاكل في القلب مثل ألم في الصدر.
- آلام حادة في المعدة أو أي علامة لوجود نزيف في المعدة أو الأمعاء ، كخروج براز أسود اللون أو ممتزج بالدماء ، أو تقيؤ الدم .
- تفاعلات جلدية مثل الطفح الجلدي ، وظهور بثور أو تقشير للجلد .
- فشل الكبد {وتشمل الأعراض غثيان ، إسهال ، يرقان (إصفرار الجلد أو إصفرار بياض العينين) }.

آثار جانبية شائعة جداً : يؤثر على أكثر من 1 في كل 10 أشخاص:

- ارتفاع ضغط الدم *

آثار جانبية شائعة : تؤثر في 1 إلى 10 من كل 100 شخص :

- أزمة قلبية *
- تجمع السوائل مع تورم الكاحلين والأرجل و / أو اليدين .
- التهابات المسالك البولية.
- ضيق في التنفس * ، التهاب الجيوب الأنفية (عدوى انسداد أو ألم في الجيوب الأنفية)،
- انسداد أو سيلان الأنف ، التهاب في الحلق ، سعال ، نزلات البرد ، وأعراض تشبه الانفلونزا .
- دوخة ، صعوبة في النوم.
- * القيء ، آلام في المعدة ، إسهال ، عسر الهضم ، و خروج ريح .
- طفح جلدي ، حكة .
- تصلب العضلات .
- صعوبة في البلع *.
- تفاقم الحساسية القائمة .

آثار جانبية غير شائعة : تؤثر في 1 إلى 10 أشخاص في كل 1000 شخص :

- السكتة الدماغية *.
- قصور في القلب ، خفقان ، سرعة ضربات القلب .
- تفاقم ارتفاع ضغط الدم .
- اضطرابات في اختبارات وظائف الكبد في الدم.
- اضطرابات في اختبارات وظائف الكلى في الدم.
- فقر الدم (تغيرات في خلايا الدم الحمراء التي يمكن أن تسبب التعب وضيق التنفس).
- قلق ، اكتئاب ، تعب ، نعاس ، و شعور بالوخز.
- مستويات عالية من البوتاسيوم في نتائج فحص الدم (قد تسبب الغثيان، التعب ، ضعف العضلات أو خفقان).
- عدم وضوح الرؤية ، طنين في الأذنين، آلام في الفم و قروح، وصعوبة في السمع *.
- إمساك ، تجشؤ ، التهاب المعدة (عسر الهضم ، ألم في المعدة أو قيء)، تفاقم الالتهاب في المعدة أو الأمعاء.
- تقلصات في الساق.
- طفح مع التهاب وحكة.

آثار جانبية نادرة : تؤثر في 1 إلى 10 أشخاص في كل 10000 :

- قرح (نزيف) في المعدة و المريء أو الأمعاء ،أو تمزق في الأمعاء (الذي قد يسبب
- آلام في المعدة ، حمى ، غثيان ، قيء ، انسداد الأمعاء) ، براز داكن أو أسود اللون ، التهاب المريء
- (يمكن أن يسبب صعوبة في البلع) ، التهاب البنكرياس (يمكن أن يؤدي إلى آلام في المعدة) .
- انخفاض عدد كرات الدم البيضاء (التي تساعد على حماية الجسم من العدوى) و الصفائح الدموية (مما يسبب زيادة فرصة حدوث نزيف أو كدمات).
- صعوبة في تنسيق الحركات العضلية.
- الارتباك ، وتغير في حاسة التذوق.
- زيادة الحساسية للضوء.
- فقدان الشعر.

آثار جانبية لا يمكن أن يقدر معدل حدوثها من البيانات المتاحة :

- نزيف في المخ.
- تفاعلات حساسية خطيرة (بما في ذلك صدمة الحساسية) التي يمكن أن تسبب طفح جلدي ، تورم في الوجه ، الشفتين ، اللسان ، الفم أو الحلق ، صعوبة أو أزيز في التنفس؛ صعوبة في البلع.

- نزيف في المعدة أو الأمعاء (يمكن أن يؤدي إلى ظهور الدم في البراز أو القيء) ، والتهاب القولون أو الأمعاء ، و غثيان.
 - حالات خطيرة في الجلد مثل متلازمة ستيفنز جونسون ، التهاب الجلد التقشري و انحلال البشرة السام (يمكن أن يسبب طفح جلدي ، وظهور بثور أو تقشير للجلد) وداء البثور الطفحي الحاد و المعمم (منطقة منتفخة حمراء مع بثور صغيرة عديدة).
 - فشل الكبد ، تلف الكبد والتهاب حاد في الكبد (قاتلة في بعض الأحيان أو تتطلب عملية زرع للكبد). قد تتضمن الأعراض : الغثيان، الإسهال ، اليرقان (اصفرار لون الجلد أو العينين)، بول داكن ،براز شاحب ، سهولة حدوث النزيف ، حكة أو رعشة.
 - مشاكل في الكلى (قد يحدث فشل كلوي ، التهاب في الكلى).
 - تجلط الدم في الأوعية الدموية في الرئتين. يمكن أن تشمل الأعراض ضيق مفاجئ في التنفس، آلام حادة أو هبوط عند التنفس.
 - عدم انتظام ضربات القلب.
 - التهاب سحائي (التهاب الغشاء المحيط بالمخ والحبل الشوكي).
 - الهلوسة.
 - تفاقم الصرع (قد تصبح التشنجات أكثر حدوثا و / أو أكثر شدة).
 - التهاب الأوعية الدموية (يمكن أن يسبب حمى ، آلام ، بقع بنفسجية على الجلد).
 - انسداد شريان أو وريد في العين مما يؤدي إلى فقدان جزئي أو كامل للرؤية ، التهاب الملتحمة، ونزيف في العين.
 - انخفاض في عدد خلايا الدم الحمراء والبيضاء والصفائح الدموية (قد يسبب تعب، سهولة حدوث كدمات، نزيف متكرر في الأنف وزيادة خطر حدوث عدوى).
 - ألم في الصدر.
 - اضطراب في حاسة الشم.
 - تغير في لون الجلد (كدمات) ، ألم وضعف في العضلات ،آلام المفاصل.
 - اضطرابات الدورة الشهرية.
 - صداع ، احمرار في الوجه.
 - انخفاض مستويات الصوديوم في نتائج فحص الدم (قد يسبب فقدان الشهية ، صداع ، غثيان، تقلصات وضعف في العضلات).
- في الدراسات الإكلينيكية غير المرتبطة بالتهاب المفاصل أو أمراض المفاصل الأخرى ، حيث يتم تناول سيليكوكس في جرعات 400مجم يوميا لمدة تصل إلى 3 سنوات ، لوحظ حدوث التأثيرات الجانبية التالية بالإضافة لما سبق :

آثار جانبية شائعة : تؤثر في 1 إلى 10 من كل 100 شخص :

- مشاكل في القلب : ذبحة صدرية (ألم في الصدر).
- مشاكل في المعدة : أعراض القولون العصبي (ويمكن أن يشمل ألم في المعدة ، إسهال ، عسر الهضم و غازات)
- حصوات الكلى (والتي قد تؤدي إلى آلام في المعدة أو الظهر، دم في البول) ، وصعوبة التبول.
- زيادة الوزن .

آثار جانبية غير شائعة : تؤثر في 1 إلى 10 أشخاص في كل 1000 شخص :

- تجلطات في الأوردة العميقة (عادة تجلط الدم في الساق ، والذي قد يسبب ألم ، تورم أو احمرار في الساق أو مشاكل في التنفس).
- مشاكل في المعدة : عدوى المعدة (الذي يمكن أن يسبب تهيج وقرح في المعدة والأمعاء).

- كسور فى الأطراف السفلية.
- هريس منطقى ، عدوى الجلد ،اكزيما (طفح جلدى مع جفاف و حكة)، التهاب رئوي {عدوى الصدر} قد يحدث سعال، حمى ،صعوبة فى التنفس}.
- عدم وضوح الرؤية أو ضعف البصر ، دوار ناتج عن مشاكل الأذن الداخلية ، قرحة ، التهاب أو نزيف فى اللثة ، تقرحات فى الفم.
- الإفراط فى التبول ليلا ، نزيف من البواسير ، حركات متكررة فى الأمعاء.
- كتل دهنية فى الجلد أو فى أماكن أخرى ، حويصلة عقدية (تورمات غير مؤذية فى أو حول المفاصل و الأوتار فى اليد أو القدم) ، صعوبة فى التحذث ، نزيف شديد أو غير طبيعى من المهبل ، ألم فى الثدي .
- مستويات عالية من الصوديوم فى نتائج فحص الدم.
- إذا أصبحت أى من الآثار الجانبية خطيرة ، أو إذا لاحظت أى آثار جانبية غير المدرجة فى هذه النشرة ، أخبر الطبيب أو الصيدلي.

5. كيفية تخزين سيليكوكس

- احفظ الدواء بعيدا عن متناول وبصر الأطفال.
- تحفظ أقراص سيليكوكس فى مكان جاف، عند درجة حرارة لا تزيد عن 30 درجة مئوية، بعيدا عن الضوء.
- لا تستخدم سيليكوكس بعد تاريخ انتهاء الصلاحية المطبوع على العبوة.

6. مزيد من المعلومات

- ما هى مكونات سيليكوكس أقراص؟
- المادة الفعالة: سيليكوكسيب 200 مجم
- السواغ : لاكلتوز مونوهيدرات، كروسكارميللوز الصوديوم، صوديوم لاورايل سالفات، بولى فينيل بيريليدون، ايروسيل، ماغنيسيوم ستيريت.