

الأسم التجاري: كلاريميسن "أقراص" (مغلقة بكسوة غشائية)

بيان التركيب:

يحتوى كل قرص على
كلاريثروميسين 500 مجم

الصفات الدوائية:

تحتوى أقراص كلاريميسين على عقار كلاريثروميسين ذو الفاعلية ضد معظم سلالات الميكروبات المعدية الآتية:

- الميكروبات الهوائية موجبة الجرام مثل: المكورات العنقودية الذهبية والمكورات السبحية للذمونيا واستربتوكوكس بيوجينز .
- الميكروبات الهوائية سالبة الجرام مثل: هيروفيلس انفلونزا وموراكسيلا كاتاراليس بالإضافة الى كائنات دقيقة أخرى مثل ميكوبلازما نيمونيا وكلاميديا نيمونيا وايضا ميكوباكتريم أفيم المركب الذى يتكون من ميكوباكتريم افيم وميكوباكتريم انتراسيلولار .
- يحدث كلاريميسين تأثيره المضاد للبكتريا من خلال ارتباطه مع وحدة الريبوسوم 50 إس فى الميكروبات التى تستجيب له مما يؤدى الى تثبيط تشييد البروتين .

حركية الدواء:

- يمتص الكلاريثروميسين بسرعة من القناة الهضمية بعد تناوله عن طريق الفم.
- يؤخر الطعام من بداية الامتصاص ولكنه لا يؤثر على تكوين نواتج الأيض الفعالة أو مدى الإتاحة الحيوية .
- تصل قمة التركيز فى البلازما فى الاشخاص الاصحاء الغير صائمين فى خلال ساعتين الى ثلاث ساعات بعد تناول الدواء عن طريق الفم و تصل قمة التركيز فى البلازما الى حالة الثبات خلال 3 أيام وهى حوالى 3-4 ميكروجرام /مل بجرعة مقدارها 500 مجم كل 8-12 ساعة .
- نصف عمر الاخراج حوالى 5-7 ساعات بجرعة 500 مجم .
- تتغير حركية الدواء فى حالة القصور الكلوى .

دواعى الاستعمال:

توصف اقراص كلاريميسين لعلاج حالات العدوى البسيطة والمتوسطة من السلالات التى تستجيب لهذا العقار .

موانع الاستعمال

- المرضى الذين يعانون من حساسية للكلاريثروميسين او لأى من المضادات الحيوية الأخرى التابعة لمجموعة ماكروليد .
- يمنع استعمال كلاريميسين فى المرضى الذين يتناولون بيموزايد ، سيسابرايد أو تيرفينادين .

التفاعلات الدوائية:

-لاينصح بتناول كلاريميسين متزامنا مع رانيتيدين بيزموت سيتلاتات فى المرضى الذين لديهم تصفية الكرياتينين أقل من 25 مل / دقيقة أو تاريخ بورفيريا حادة.

-لايستعمل كلاريميسين مع تيرفينادين.
-الأستخدام المتزامن لكلاريميسين مع مضادات التجلط الفمية قد يزيد من تأثير مضادات التجلط الفمية.

-تم رصد ارتفاع فى مستوى الديجوكسين فى لامصل فى المرضى الذين يتناولون كلاريميسين متزامنا مع ديغوكسين.

التحذيرات و الاحتياطات :

-مثل معظم مضادات البكتريا ، كلاريميسين قد يحدث التهاب الغشاء القولونى الكاذب الذى تتراوح شدته ما بين الطفيف الى ما قد يكون مهدد للحياة .
-فى حالة التلغ الكلوى الشديد المصاحب او الغير مصاحب بالتلغ الكبدى ، يجب تقليل الجرعة او زيادة الفترة ما بين الجرعات .

الحمل :

يستخدم كلاريميسين خلال الحمل فقط اذا كانت الفوائد المحتملة تفوق المخاطر المتوقعة للجنين .

الرضاعة :

يجب توخى الحذر عند استعمال الامهات المرضعات لمستحضر كلاريميسين اقراص .

الآثار الجانبية :

قد تظهر بعض الآثار الجانبية التالية فى بعض الحالات:
الغثيان ، الاسهال ، الصداع ، عسر الهضم ، مذاق غير طبيعى بالفم ، عدم ارتياح فى المعدة والطفح الجلدى .

زيادة الجرعة :

زيادة جرعة الكلاريميسين قد تسبب الم فى البطن ، قىء ، غثيان و اسهال.

العلاج :

يجب التخلص سريعا من الدواء الغير ممتص مع عمل إجراءات تدعيمية .

الجرعة والتعاطى :

- التهاب الزور واللوز : 250 مجم (نصف قرص) كل 12 ساعة لمدة 10 أيام .
- التهاب الجيب الفكى الحاد : 500 مجم (قرص واحد) كل 12 ساعة لمدة اسبوعين .
- التفاقم الحاد لالتهاب القصبة الهوائية المزمن الناتج عن :-
- إس - نيمونيا وإم - كاتار اليس : 250 مجم (نصف قرص) كل 12 ساعة لمدة اسبوع الى اسبوعين .
- هـ - انفلونزا : 500 مجم (قرص واحد) كل 12 ساعة لمدة اسبوع الى اسبوعين .
- النيمونيا المكتسبة الناتجة عن :

- إس - نيمونيا ، إم - نيمونيا وسى نيمونيا : 250 مجم (نصف قرص) كل 12 ساعة لمدة اسبوع الى اسبوعين .
- الجلد و تركيب الجلد الغير معقد : 250 مجم (نصف قرص) كل 12 ساعة لمدة اسبوع الى اسبوعين .
 - العدوى الميكوبكتيرية :
 - لمنع المرض الناتج عن ميكوبكتريم افيم : 500 مجم (قرص واحد) كل 12 ساعة.
 - لعلاج العدوى المنتشرة الناتجة عند ميكوبكتريم أفيم كومبلكس يجب اعطاء اقراص كلاريميسين مع احدى الادوية المضادة للبكتريا التى ثبت ان لها نشاط اكلينيكي .
 - الجرعة الموصوفة 500 مجم (قرص واحد) كل 12 ساعة.

الفئة العلاجية : مضاد للبكتريا .

الفئة القانونية : يصرف بتذكرة طبية .

العبوة : علب تحتوى كل منها على 10 أقراص .

التخزين : يحفظ عند درجة حرارة الغرفة 20 م° - 25 م°، فى عبوة محكمة الغلق.

تحذير لاتباع الاستعمال الجيد للدواء

(ان هذا الدواء)

- الدواء مستحضر يؤثر على صحتك و استهلاكه خلافا للتعليمات يعرضك للخطر .
- أتبع بدقة وصفة الطبيب و طريقة الاستعمال المنصوص عليها و تعليمات الصيدلى الذى صرفها لك .
- فالطبيب و الصيدلى هما الخبيران بالدواء و بفعله و ضرره .
- لا تقطع مدة العلاج المحددة لك من تلقاء نفسك .
- لا تكرر صرف الدواء بدون وصفة طبية .
- لا تترك الأدوية فى متناول أيدي الأطفال