

الاسم التجارى : ريلاكسين أقراص

الاسم العلمى : ثيوكولشييكوسايد

بيان التركيب :

يحتوى كل قرص على :

ثيوكولشييكوسايد 4 مجم

سواغ :

تلك ، سكروز ، نشا ، لاكتوز ، جيلاتين ، ماغنسيوم ستيريت

الشكل الصيدلى : أقراص

الصفات الدوائية :

ريلاكسين باسط و مزيل لتقلص العضلات (مركزى المنشأ)
- يعمل ريلاكسين عن طريق إزالة أو التخفيف من تقلص العضلات
فى حالة زيادة إنقباض العضلات ، فإنه يعمل على التقليل من مقاومه السالبه للعضلات
المشدوده (المتقلصه) و يقلل من التقلص المستمر ، و يعمل ريلاكسين من خلال وسائط الجهاز
العصبى المركزى و ليس عن طريق عمل شلل فى الترابط العضلى العصبى.

- يشتمل تأثيره الباسط للعضلات على عضلات الأحشاء خاصة " عضلات الرحم.

- ريلاكسين له قابليه إختياريه لمستقبلات جابا و أيضا له خواص منشطات المستقبلات
الجليسينرجية .

- لا يعمل ريلاكسين على العضلات الإرادية لذلك لا يؤثر على الجهاز التنفسى أو على القلب و
الأوعيه الدمويه.

حركية الدواء :

بعد تعاطى ريلاكسين عن طريق الفم ، يصل أعلى تركيز له فى البلازما بعد 50 دقيقه.

- فترة نصف العمر الإخراجى 4 ساعات و نصف.

- يتم إخراج ثيوكولشييكوسايد عن طريق الكلى بدون أى تغيير.

دواعى الإستعمال :

يوصف ريلاكسين كعلاج مكمل (مساعد) فى حالات التقلص المؤلم للعضلات.

الجرعه و التعاطى :

البالغين أكثر من 15 سنه : 4 أقراص يوميا فى جرعات مقسمه

يجب بلع الأقراص مع كوب مملوء من الماء.

موانع الإستعمال :

يمنع استخدام ريلاكسين أقراص فى حالة فرط الحساسيه لثيوكولشييكوسايد أو لمركب الكولشيسين
أو أى من مكونات الدواء.

الآثار الجانبية :

- نادرا" ما يحدث حالات فرط الحساسية مثل أرتيكاريا ، تورم أو صدمة ناتجة من حساسية، اضطرابات في الجهاز الهضمي (ألم بالمعدة و إسهال).
- نادرا" جدا" ما يحدث : طفح وردى ، طفح جلدى بقعى بثرى ، طفح جلدى حويصلى بثرى.

الحمل :

لا يفضل استخدام ريلاكسين فى الثلاثة شهور الأولى من الحمل.

الرضاعة :

يجب عدم وصف ريلاكسين أثناء الرضاعة.

الإحتياطات و التحذيرات :

- يجب استخدام ريلاكسين أقرص بحرص فى حالة مرضى الصرع أو المرضى المعرضين للتشنجات.
- يجب خفض جرعة ريلاكسين أقرص فى حالة وجود اسهال.
- نتيجة وجود السكروز و الاكتوز فى المستحضر ، يمنع تعاطى ريلاكسين فى حالة الامراض الاتية: : وجود سكر اللبن الوراثى فى الدم ، عدم تحمل الفركتوز ، متلازمة سوء امتصاص الجلوكوز و الجلاكتوز و فى حالة نقص إنزيم الاكتيز و السكروز أيزو مالتيز. كما يمنع استخدامه مع مرضى السكر.

الفئه العلاجيه : باسط للعضلات

الفئه القانونيه : يصرف بتذكره طبيه

العبوه : عبوة كرتون تحتوى على 12 قرص فى شريط AL/P.V.C

التخزين : يخزن فى مكان جاف عند درجة حرارة لا تزيد عن 30 ° درجة مئوية بعيدا عن الضوء.

تحذير لاتباع الاستعمال الجيد للدواء

(ان هذا الدواء)

- الدواء مستحضر يؤثر على صحتك و استهلاكه خلافا للتعليمات يعرضك للخطر .
- أتبع بدقة وصفة الطبيب و طريقة الاستعمال المنصوص عليها و تعليمات الصيدلى الذى صرفها لك .
- فالطبيب و الصيدلى هما الخبيران بالدواء و بنفعه و ضرره .
- لا تقطع مدة العلاج المحددة لك من تلقاء نفسك .
- لا تكرر صرف الدواء بدون وصفة طبية .

لا تترك الأدوية فى متناول أيدي الأطفال